



38044

615
M 15

ЛІКАРСЬКІ І ПАХУЧІ РОСЛИНИ.

Вказівка культури, збирання, цілючих
вданнів і споживку.

Склав Д. Максименко.

Дніпропетровська
обласна бібліотека

Полтава.

Електрична друкарня „Труд“, Котляревська 31.

1918 р.

З м і с т.

	Стор.
Передмова	IX
Умовини поступного розвитку культур лікарських рослин	XI
Необхідність культури лікарських рослин	—
Насіння для розводіння лікарських рослин	XII
Збирання і хованка лікарських рослин	—
Пахучі рослини і вироби запашних річей	XIII

Однолітні і двухлітні культури.

Allium sativum.—Часник	1
Anethum graveol.—Укріп	—
Angelica silvestris.—Дягиль, дудник	—
Arhangelica off.—Дягиль городній	2
Arctium lappa.—Лопух, репях	3
Bidens tripartita.—Собачі репашки, череда, стрілки	—
Borrago off.—Огірочник	4
Calendula off.—Нагідки	—
Cannabis sativa.—Коноплі	5
Capsicum annuum.—Перець струковий	—
Carthamus tinct.—Крокіс	—
Claviceps purpurea.—Ріжки	6
Cnicus bened.—Будяк	7
Conium maculatum.—Блекіт, болиголов	8
Coriandrum sativum.—Коляндра	—
Datura straton.—Диндир	9
Delphinium consol.—Косарники, софірки	—

<i>Digitalis purpurea</i> .—Наперстянка	9
<i>Erythraea cent.</i> —Сердушник, ясенець	10
<i>Foeniculum vulgare</i> .—Волоський укріп	11
<i>Fumaria off.</i> —Польова рута	—
<i>Hyoscyamus niger</i> .—Німиця	12
<i>Lactuca virosa</i> .—Молочай	—
<i>Malva silvestris</i> .—Калачики, проскурки	—
<i>Matricaria cham.</i> —Роман	13
<i>Melilotus coerul.</i> —Буркун зілля	14
<i>Melilotus off.</i> —Боркун жовтий	—
<i>Melittis Melissoph.</i> —Пахуче кадило, гадін язик	15
<i>Nicotiana Tabacum</i> .—Тютюн	—
<i>Nigella</i> .—Чорнушка	—
<i>Oenanthe phelland.</i> —Кінський укріп	16
<i>Ocimum Basil.</i> —Васильки	—
<i>Papaver somn.</i> —Мак	17
<i>Papaver rhoeas</i> .—Мак дикий, самосійка	—
<i>Petroselinum sativ.</i> —Петрушка	—
<i>Pimpinella anisum</i> .—Ганус	18
<i>Pimpinella saxifr.</i> —Ганус кульшастий	—
<i>Plantago lanceol.</i> —Подорожник	19
<i>Ricinus</i> .—Рай-дерево	—
<i>Satureja hort.</i> —Чебрець	20
<i>Sinapis</i> .—Гірчиця біла, чорна, сарептська	—
<i>Verbascum thapsis</i> .—Медвежаче вушко, дивина	21

Многолітні культури.

<i>Achillea mill.</i> —Кривавник, серпоріз, деревій	23
<i>Aconitum lycost.</i> —Цар-зілля, чорно-зілля	—
<i>Aconitum napellus</i> .—Зозуліни черевички, борець	24
<i>Acorus calamus</i> .—Татарське зілля, айр	—

<i>Adonis aestiv.</i> —Горицвіт червоний	25
<i>Adonis vernalis.</i> —Гороцвіт жовтий	—
<i>Agrimonia eupat.</i> —Парило, парник	26
<i>Ajuga reptans.</i> —Суховершки, гостровершки, гор- лянка	—
<i>Althaea off.</i> —Проскурняк	—
<i>Althaea rosea.</i> —Рожа	27
<i>Anemone hepatica.</i> —Первоцвіт, проліска	29
<i>Anemone nemerosa.</i> —Коросліп	—
<i>Anemone pulsatilla.</i> —Сон, сон-трава	—
<i>Anemone silvestris.</i> —Білий сон	30
<i>Arctostaphylos uva.</i> —Мучниця	—
<i>Aristolochia clemat.</i> —Філійник	—
<i>Aristolochia serpent.</i> —Філійник американський	31
<i>Arnica montana.</i> —Арника, бараняча трава.	—
<i>Artemisia absint.</i> —Полинь	32
<i>Artemisia cina.</i> —Полинь цитварний	33
<i>Artemisia vulgare</i> —Нехворощ	34
<i>Artemisia Drac.</i> —Острогон, турган	—
<i>Arum maculatum.</i> —Козяча борода	—
<i>Asarum europ.</i> —Копитець	35
<i>Asperula odorata.</i> —Пахуча смілка	36
<i>Aspidium filix.</i> —Папороть	—
<i>Atropa belladonna.</i> —Вовчі ягоди	37
<i>Betonica off.</i> —Буковиця	—
<i>Bryonia alba.</i> —Переступень	38
<i>Carlina acaulis.</i> —Відкасики	—
<i>Carum carvi.</i> —Тмиш	—
<i>Chelidonium majus.</i> —Молочай, глекопар	39
<i>Cichorium intybus.</i> —Петрові батоги	40
<i>Circaea lutetiana.</i> —Відьмине зілля	—

<i>Colchicum autumn.</i> —Зимовик, шафран дикий	41
<i>Convallaria majalis.</i> —Конвалія	—
<i>Crocus sativus.</i> —Шафран дійсний	42
<i>Cynanchum vincet.</i> —Бородач	43
<i>Cynoglossum off.</i> —Чорно-корінь	—
<i>Dictamnus albus.</i> —Ломиніс	—
<i>Gentiana lutea.</i> —Товстуха, тирлич	44
<i>Geum urbanum.</i> —Вивішник, гребінник	45
<i>Glycyrrhiza glabra.</i> —Солодковий корінь	—
<i>Gratiola off.</i> —Золототисячник, дрісливець	46
<i>Helleborus niger.</i> —Морозник чорний	47
<i>Helleborus viridis.</i> —Морозник зелений	—
<i>Hesperis matronalis.</i> —Вечерниці душисті	—
<i>Humulus lupulus.</i> —Хміль	—
<i>Hypericum perforat.</i> —Святоянське зілля	48
<i>Hyssopus off.</i> —Ісоп	—
<i>Hydrastis canad.</i> —Жовтий корінь	49
<i>Junula helem.</i> —Оман	—
<i>Iris florient.</i> —Півники	50
<i>Laserpitium latf.</i> —Лиходійна трава, стародуб	—
<i>Lavandula off.</i> —Лаванда	51
<i>Lilium candidum.</i> —Крин, лелія біла	—
<i>Linaria vulgaris.</i> —Дзвіночки, зайців льон	52
<i>Lychnis viscaria.</i> —Смілька	—
<i>Levisticum off.</i> —Любисток	—
<i>Melissa off.</i> —Мята цитриніова	—
<i>Mentha.</i> —Мята садова, холодна і японська	53
<i>Menyanthes trifol.</i> —Бобовник, трифолія	54
<i>Narcissus pseud.</i> —Нарцис	55
<i>Orchis militaris.</i> —Любка	—
<i>Origanum majorana.</i> —Майоран	56

<i>Origanum vulgare</i> .—Материнка	56
<i>Paris quadrif.</i> —Вороне око	57
<i>Platanthera bifolia</i> .—Любка, нічна хвіялка	—
<i>Polygonum bistorta</i> .—Левурда, ракові шийки	—
<i>Polygonum hydrop.</i> —Гірчак	58
<i>Primula off.</i> —Сорочі лапки, божі ручки	—
<i>Pulmonaria off.</i> —Медунка	59
<i>Purelthrum car.</i> —Роман перський	—
<i>Purethrum T. D.</i> —Канупір	60
<i>Ranunculis flamm.</i> —Козелець, дрібноцвіт	—
<i>Rheum palmatum</i> .—Ревінь	61
<i>Rybia tinctor.</i> —Марена	62
<i>Ruta gravel.</i> —Рута	—
<i>Salvia off.</i> —Шавлія	63
<i>Saponaria off.</i> —Мильник, мильна трава	—
<i>Sanguisorba off.</i> —Родовик, сухозлотниця	64
<i>Serratula tinctoria</i> .—Серп	—
<i>Symphytum off.</i> —Живокість	—
<i>Tanacetum vulgare</i> .—Пижмо, мишка, навротич	65
<i>Taraxacum off.</i> —Кульбаба, летучки, маївка	—
<i>Tussilago farf.</i> —Підбіль, ранник, цар-зілля	66
<i>Urtica dioica</i> . Кропива	—
<i>Valeriana off.</i> —Оовер'ян	67
<i>Veratrum</i> .—Чемериця біла і чорна	—
<i>Viola odorata</i> . Хвіялка	68
<i>Viola tricolor</i> .—Братки, полуцвіт	69

Кущі і дерева.

<i>Amygdalic commun.</i> —Мигдаль	70
<i>Cydonia vulgaris</i> .—Квитове дерево, куделя	—
<i>Daphne mezereum</i> .—Вовче лико	—

<i>Fagus sylvestrica</i> .—Бук	71
<i>Fraxinus excelsior</i> .—Ясен	—
<i>Genista tinctoria</i> .—Дрік	71
<i>Juglans regia</i> .—Оріх волоський	72
<i>Juniperus commun</i> .—Яловець	—
<i>Juniperus sabina</i> .—Яловець козацький	73
<i>Laurus nobilis</i> . Лавір	—
<i>Ledum palustre</i> . Багно, болотник	74
<i>Ononis spinosa</i> .—Вовча трава, вовчук	—
<i>Pinus sylvestris</i> .—Сосна	75
<i>Pópus</i> .—Тополя	—
<i>Punica Granatum</i> . Гранатове дерево	76
<i>Prunus cerasus</i> .—Вишня	—
<i>Quercus pedunc</i> .—Дуб	—
<i>Rhamnus</i> .—Крушина, жостір	77
<i>Rhamnus purshiana</i> .—Крушина американська	78
<i>Rhus toxicod</i> .—Сумак, скомпія	—
<i>Rosa gallica</i> .—Повна рожа, троянда	79
<i>Rosmarinus off</i> .—Розмайран	80
<i>Rubus idaeus</i> .—Малина	81
<i>Sambucus nigra</i> .—Бузина чорна	—
<i>Solanum dulcam</i> .—Паслін, глистяк, надтинник	82
<i>Thymus serpyllum</i> .—Чебрець, чебрик	—
<i>Thymus vulg</i> .—Чебрець пахучий	83
<i>Tilla parvifolia</i> .—Липа	—
<i>Vaccinium myrtill</i> .—Чорниця, боровиця	84
<i>Vaccinium oxycoccus</i> .—Журавина	—
Абетлова вказівка рослин	85

П Е Р Е Д М О В А.

Перед самою війною Болгарія виробляла щорічно на 800 т. руб. рожевої олії; містечко Калєда, в Німещині, продавало щорічно на 30 т. руб. мяти, на 13¹/₂ т. руб. дягиля; Англія вивозила щорічно мятної олії на 200 т. руб.. І це робилось в ті самі роки, коли Росія привозила щорічно аптекарських товарів: з Німещини на 16¹/₂ міл. руб. і з інших країв на 4¹/₂ міл. руб.. Себто, Росія за те, що в неї є дсма, щорічно платила 21 міл. руб. чужеземцям. Щож цьому було причиною? Причин багато... у нас навіть нема книжки, з котрої-б ми могли добути корисні знання про культуру лікарських рослин. Дещо ми культивуєм, але не вмієм його довести до пуття, наприкл., не вмієм виробляти ефірну олію. Головна причина—у нас нема поводиря—спеціальної школи, котра-б навчала, які у нас є лікарські рослини, як їх ростити, збирати і що з них можна добувати. Наша одсталість і підневолення од «заграниці» так далеко зайшли, що хоч-би ми тепера і вміли і хтіли культивувати лікарські рослини, то перша тому препона—у нас нема насіння на розводіння. Ціль моєї книги—хоч крихточку допомогти розвитку у нас промислової культури лікарських рослин. При

складанні цієї книги канвою служили ось які праці: «*Н. А. Монтеверде*.—Ботанический атласъ. Описание и изображение Русской Флоры. *В. К. Варлихъ*.—Русскія лекарственныя растенія. Атласъ и ботаническое описание. *В. Паишевичъ*.—Культура лекарственныхъ растений и душистыхъ. *В. Н. Спаскій*.—Лекарственныя растенія (по сочин. Егера). *Е. Тимченко*.—Русско-малорусскій словарь. Томы 1—II. Кіевъ. 1897—1899.» Я дуже бажав поруч з текстом дати малюнки фарбами рослин, але на ділі виявилось, що в сучасні часи загального безладдя про це можна тільки гадати. Всі вказівки прийму з подякою.

Д. Максименко.

Полтава.
25 березня 1918 р.

Умовини поступного розвитку культур лікарських рослин.

Культивування лікарських рослин дуже корисна річ: а) воно може дати роботу старим людям і дітям; б) многі лікарські рослини медоносні, їх можна рвзводити коло пасіки і мати подвійну користь і в) деякі лікарські рослини не потребують доброї землі—можуть рости по проваллях, болотах і пісках. Але періше, ніж за це діло братись, треба поміркувати. Почин робити тра ступнево. Можно культивувати тільки обмежане число рослин: одну—дві—три, звернувши повагу на ретельне добування з них продукта. Треба мати на виду, що найкорисніше збувати вироблений чистий продукт, наприкл., олії: мятну, овер'янову, лавандову та инш.. А для цього потребується не мало сирого матеріалу.

Необхідність культури лікарських рослин.

Дешевизна товару з дикоростучих рослин зводить на безцінок працю збирачів трав з одного боку, а з другого значна трата часу на вишукування цих трав ще більш обезцінює працю збирачів. Ці обставини у многих випадках роблять більш кориснішою масову культуру дикоростучих лікарських рослин, на які є значний спит, і котрі мало розновсюджені в дикім виді. Своїм чергом, збираючи щорічно в данім місці цвіт одних рослин, насіння других, ко-

ріння третіх, ми неминуче зменшуем рік від року кількість самосівних рослин; флора ступнево біднішає і нарешті многі види можуть зовсім зникнути в данім місці. Необхідно взяти на увагу й те, що рік від року кількість пустирів і перелогів скорочується, а вкупі з тим зменшується й площа, на котрій збирались дикорстучі трави. Це своїм чергом веде до необхідности культури їх. До цього треба докласти, що ми маєм не мало екзотичних рослин, згідних витримувати наш климат і давати лікарський продукт, наприклад: мята, шавлія, острогон, майоран та инш.. Все це веде до необхідности культури лікарських рослин.

Насіння для розводіння лікарських рослин.

Для розводіння многих дикоростучих рослин, треба мати запаси насіння в одних випадках, в других коренища чи коріння. Для збирання насіння, розуміється, необхідне ретельне знання рослини навіть після того, як листя і стеблина висохнуть. В цім разі можна користуватись книгою Варліха. Насіння ховають в сухе мешкання з невиводною низькою температурою і чистим духом. Коріння тримають в холодних льохах, пересипають вохким піском. Велике насіння з твердою шкурлуною—жолудики, оріхи, камінчики та инш. теж пересипають піском.

Збирання і хованка лікарських рослин.

Відносно кожної лікарської рослини необхідно тра мати досвід, які йменно частини мають медичне

значіння і належить збирати, чи може й вся рослина находить собі споживок. З другого боку, необхідно знати час збирання. Нарешті, необхідно знати і як збирати ту чи иншу рослину і як її хоронити. Російська Формакопея вказує: «Цвіт треба збирати з початку цвітіння в хороше надвір'я і зараз-же сушити в затінку. Сухий цвіт ховати в добре закоркованім посуді, в сухім, темнім місці. Листя збирати в пору цвітіння і зараз-же сушити. Ховати так само. Збирання і сушіння стеблин з листям і цвітом робиться і заховується теж так само. Коріння і коренища збирають в осени чи весною. Зібране свіже коріння очищається од землі, обмивається в холодній воді і сушиться на вітрі чи в сушільні при 40°—50°. Насіння повинно бути спіле, ціле і без пороху. Бруньки деяких рослин вживають в сухім виді (напр., сосни), а деяких в свіжім (як, наприкл., тополі)». Добрий товар легко найде собі збут і ціна на його буде вища.

Пахучі рослини і вироби запашних річей.

Многі лікарські рослини мають пахучість і йдуть на добування ефірних олій (мята, ганус, коляндр, укріп та инш.). А є много й таких рослин, що виключно культивуються за-для добування пахучих олій для парфюмерного діла, наприклад: братки, резеда, жасмін, акація біла та инш. Культуррами пахучих рослин дуже славиться півд. Франція; їх розвитку, запевне, допомагають фабрики. Щоб забез-

печити собі корисний збут сирих матеріалів, господарства, що викохують пахучі рослини сполучаються в кооператив і постачають продукти прямо на фабрики безо всяких посередників. Це удешевляє парфюмерні вироби. Україна виявляє собою величезний обшир з різностайними ґрунтовими умовами,—обшир, на котрому можуть найти собі місце всякі культури як чисто лікарських рослин, так і рослин пахучих, котрі можуть дати запашні речі. Дуже важно, щоб у нас на Україні розвивсь фабричний виріб запашних і лікарських річей з продуктів рослин. Перше, запевне, повинні виникнути кустарні вироби лікарських і пахучих річей, котрі й допоможуть розвитку культур. Кустарні вироби мятної олії на Полтавщині вже давно відомі. Таким робом повинні виникнути й вироби запашних річей. Політехнікуми і технологічні інститути повинні звернути увагу на подавання вищих знаннів, які необхідні для ретельної постанови у нас фабричного виробу запашних і лікарських річей.

Однолітні і двулiтні культури.

1) *Allium sativum* L.—Часник.

В лікаруванні цю городину часами вживають в середину, як глистогонну зараду, а поверхню на оклади при ломцеві і для промивання грубих заглисчаних (*Oxuris vermicularis*) кишок. Розмножують з головок, так як часник майже ніколи не дає насіння.

2) *Anethum graveol.* L.—Укріп.

Листя цієї городньої рослини йде в страву, а з насіння (*Fructus Anethi*) вигонять олію (*Oleum Anethi*), котра має споживок в медицині, йде на виробу вин і в парфюмерію. Розмножується самосiвом; легко дичавіє.

3) *Angelica sylvestris* L.—Дягиль, дудник.

Зустрічається в лісах, чагарниках і на вохких місцях по всьній Європі, на Кавказі і в Сiбiрі. Цвіте з липня до вересня. Насіння й корінь (*Radix і Semen Angelicae sylvestris*) мають споживок в медицині, найбільш в ветеринарній. Рослина медоносна. В руску фармаколею не включена.

4) *Archangelica* off. Н.—Дягиль городній

Дягиль культивують найбільш за-для його коріння (*Radix s. Rhizoma Angelicae*), з котрого готують так називну англійську гіркоту, варення і в аптеках—екстракт і складний дягильний спирт. Всі частини цієї рослини пахучі і ostrі на смак. З насіння і коріння виробляють ефірну олію, що йде на вироб вин та в парфюмерію. Окрім цього, коренища й коріння мають широкий споживок в народній медицині. Цвіти щиро одвідуються бджолами.

Сіють дягиль зараз-же, як тільки-но виспіє насіння, рядками чи в розкид, як моркву; чи заготовляють росаду і садять в осени, рослину од рослини через 1—1¹/₂ ф.. Можна сіяти і весною. Сходить не рівно, деякі насіннини сходять аж через рік. Коріння викопують аж на другий рік, весною чи пізно в осени, і скоро сушать. Хоронять в заткнутих посуді, в сухім місці. Коли в перше літо появляться бадилляки з цвітом, їх треба позрізати, а то коріння буде тонке і тверде.

У Франції, в Монбрізоні, з дягиля добувають ефірну олію двохродово: з коріння і насіння. Там на плантації дягиль стоїть дві літі,—коріння викопують тільки 3-х літньої рослини. Убирати дягиль треба саме в пору, як тільки головні парасольки почнуть достигати, нижні парасилько доходять в снопах. А при достатку робочих рук можна убирати двома заходами: перший раз зрізати головні парасольки, а в другий—решту вмісті з бадиллячам. Ефірної олії

виходить: з насіння 1,15⁰/₀, з сухого коріння 0,75—1⁰/₀, а з свіжого—од 0,35 до 0,48⁰/₀.

5) *Arctium lappa* L.—Лопух, репях.

Лопухове коріння вживають в більшині для готування репяхової олії (засіб для ростіння волосся), через що культивування його може бути прибутним. Розмножують з насіння і кусочками коріння. Цвіте на друге літо. Коріння викопують в осени або весною, а для вживання в свіжій формі,—коли попаде. Декокт з коріння (15—60 част. на 1000 води)—потогонна, сечегонна і очищаюча зарада. Вживають, коли гниє легке, при подагрі, ломцеві, болях шкіри і гнояних паршах. Лист прикладають спіднім боком до пухлятини і до грудей, як болять. Корінь отримує в собі чимало крохмалю, а з стовбуриння випаляють поташ.

6) *Bidens tripart.* L.—Собачі репяхи, череда, стрілки.

Цю рослину народ вживає як чай при золотусі. Зустрічається на берегах, в ровах і болотах. Завишки коло пів—аршина; бадилля червонувате; лист розділений на три частки, з котрих середня найдовша; частки листя з зарубинками, цвіт дрібний, походжий на жовті кгузики. Як потерти цю рослину в руках, то рознесеться брудний запах. Цвіте з по-

ловини липня до вересня. Можна новмисне засівати на низьких вохких місцях. Лікарське значіння має бадилля (*Nerba Bidentis triart*) вмісті з цвітом, котрі отримують в собі: білкові речі, чиньбарні, ефірну олію та инш.. Рускою фармакопеею не прийнята, але рекомендується збирати для аптечних складів.

7) *Borrago off. L.*—Огірочник.

Огірочник—дика медова рослина з лікарними вданнями і відома городня річ, як салата, з запахом свіжого оргірка. В наших аптеках нею користуються рідко, як сечегонною зарадою. Лікарні вдання має листя і цвіт (*Nerba flores Borragiuis*). Виробляють екстракт з свіжого листя в пору цвітіння. В народі огірочникомъ теж кпристуються, як сечегонною помякшучою зарадою. З цвіту готують настоянку: шпарять кипятком і потім держать в теплім місці днів 4—7. Насінням в лікарських справах не користуються. Розмножується самосівом. В руску фармакопею не включений.

8) *Calendula off. L.*—Нагідки.

Рослина з саморідним запахом. Листя рідко-зубчасте, пушисте. Квітки самотні, жовтогарячі. Вживають зелень, зібрану в пору цвітіння, і квітки (*Nerba et flores Calendulae*), скоро сушать і заховують. Квітки, як тільки пожовкнуть, збирають цілі; в деяких місцях вони почитаются гарною зарадою при лікаруванні ран; їх розривають, напихають в

бутельку, вливають трошки води, добре затикають і вішають на сонці; через деякі часи на верх спливає ефірна офія—лікарство. Готують настойку. Рослина добре вдається на сухих місцях. З пелюсточок цвіту підроблюють фальшивий шафран. Спрос на цю рослину помірний. Рускою фармакопеею не прийнята.

9) *Cannabis sativa* L.—Коноплі.

Ця відома всім рослина дає прядиво, сімя (*Fructus Cannabis*) і олію (*Oleum Cannabis*). В медицині користуються висушеними вершками матірки (*Nerba Summitates*), зрізаними до запліднення, як болевгамовуючою і сонливою зарадою.

10) *Capsicum annuum* L.—Перець струковий.

Культивується на городах. Догляд складається з поливки і полоття. Плоди визрівають в серпні-жовтні, кстрі і йдуть в діло (*Fructus Capsici annui*). Поблизу Астрахані на острові Черепасі масами культивують цю рослину. Плоди сушать і мелють; в молотім виді пускають в продаж великими кількостями. В медицині вживають спиртову настойку (*Tinctura Sapsici*), як поверхній відтягуючий біль засіб, в примішці втирання.

11) *Carthamus tinctorius* L.—Крокіс.

Крокіс в аптеках звут *Flores* і *Semen Carthami gallici*; його цвіт вмісті з насінням вживають як

сильно проносну зараду, але рідко; з цвіту підроблюють фальшивий шафран. Крокісу є два види: той, що з маленькими листочками і стебллям без водосинок, йде в діло, а другий так собі росте по садках. Крокіс місцями культивують великими кількостями. Сіють весною, рядками. Цвіте в липні-серпні. Любить піски, глиняники чи вапняники. На ґрунті, де зовсім нема заліза, цвіт не буває червоним і скоро перероджується. Можна культивувати там, де на полях висіває сояшник. При сімбі рядками насіння на десятину потребується 20—25 ф.; рядок од рядка через 8—10 верш., а насіннина од насіннини через 4—6 верш.. Землю перекопують глибоко, краще коли два рази перекопати. Цвіт збирають без головок, як він з світло-червоного стане темно-червоним, скоро сушать в затінку і ховають в сухім місці. Сухий цвіт складають в купки на $1\frac{1}{2}$ арш. заввишки, кладуть на неї дошку, навалюють каменем і щоденно мішають, поки купка не перестане нагріватись. Як цього не робити, то цвіт в бочках чи скринях загірється і втратить свій колір. Врожай буває всякий. Десятина може видати 10—12 пудів цвіту і 70—80 пудів насіння, котре йде в страву і на освіщення. Насінням годують птах. З пелюсточок цвіту вироблюють жовту і рожеву фарбу. Порошок з листя крокіса молоко в сир перевертає.

12) *Claviceps purpurea* Т.—Ріжки.

Чужоїд. Росте на деяких травянистих рослинах, найбільш на житі. Уже в пору цвітіння знівичена

чим чужоїдом рослина одріжнюється од нормальної своєю формою і поверхнім видом. Чужоїд принемушає рослину виділяти солодуватий сік, котрий заманює всяку комахню, а та переносить заразу на інші рослини. При виспіванні ріжки обсипаються, перезимовують на землі, літом виростають і знов обсипаються і розносяться вітром чи комахами на цвіти, де виводиться нове покоління. Ріжки не шкодять дуже, коли їх є в зерні не більш 0, 2%. А як їх багацько, то вони придають муці хвіялковий одтінок; хліб з такої муки отруйний. Довге вживання такого хліба викликає тяжку хворобу, звісну під назвою «злої корчі»; хоріння супроводиться запомороками, корчами і дуже часто кінчається смертю. Самий простий спосіб очистити зерно од ріжків ось який: розводять 10 ф. соли в відрі води і в цім росолі затоплюють зерно в решеті, зерно тунає, а ріжки спливають; ріжки викидають, а зерно перемивають в чистій воді, і сушать. Але въ відповідних дозах чорні ріжки дуже гарна лікарна зарада. Збирають з неспілих колосків, добре сушать і хоронять в заткнутих посуді. Лікарні вдання ріжки отримують не більш одного року.

13) *Cnicus benedictus* Gärtner.—Будякъ.

Зустрічається в дикім виді на Сході і в південній Європі. Стовбур гиллякуватий; листя продовговасте, колюче; квітки жовтоваті; верхні частини насіння зубчаті з двома рядками волосинок; цвіте літом. Дає знаменитий кардобенедикт (*Herba Cardui*

benedicti). Лікарним початком служить гірка річ „кницин“, заохочуючий до їжи і побуджуючий роботу їжоварива. Зелень збирають перед самим цвітінням і сушать в затінку. На півдні де-не-де культивують. Землю любить глиняну.

14) *Conium maculatum* L.—Блекіт, болиголов.

Стеблина дудковата й гола, при землі з темно-червоними крапинками; листя зверху темно-зелене, знизу світло-зелене; цвіт білий. Цвіте з травня до осені. Вся рослина одганяє бридким запахом і отримує в собі сильний наркотичний яд. В лікарування йде стебілля і насіння (*Herba Coni* і *Fructus Coni maculat*). Листя і вершки збирають з початку цвітіння і обережно сушать при температурі не вище 25° Ц. (20° Р.).

15) *Coriandrum sativum* L.—Коляндра.

Цю рослину масами культивують в Німещині, Голандії, Франції, Англії і у нас де-не-де за-для її насіння, з котрого ефірна олія йде на готування вин і трохи в парфюмерію; для лікарування йде ціле насіння (*Fructus seu Semen Coriandri*), але мало. Землею не перебирає. Лучче всього сіяти після коринеплодів, весною чи в осені, рідко, рядок од рядка 1—1½ ф.; насіння на десятину йде 50—70 ф. Збирають не зовсім спілу, так як насіння легко обсипається; дають достигати на рядках чи на току.

Десятина видає 60—115 пуд. Олії виходить 1, 5°/о. В руску фармакопею не включена.

16) *Datura stramonium* L.—Диндир.

Дуже ядовита однорічна рослина. Листя велике, цвіт білий, вонючий; чотирихгніздна колюча коробочка з поморщеним насінням; цвіт розпускається ввечері, а в хмурний день закривається. Листя збирають з диких рослин в пору цвітіння і сушать в затінку; здатне тільки на один рік. Спіле насіння збирають в осени і сушать в легкій дусі. Диндир (*Folia Stramonii seu Herba Daturae* Str.) вживають, як заспокоюючу зараду при нервових хворобах, задишці і кашлі.

17) *Delphinium consolida* L.—Косарики, со- кірки.

Зустрічаються часто на полях між хлібами, а занадто розкошують по ровах і на межах. Квітки дуже гарні, сині. Цвітуть в другу половину літа. Вживають од паршів і хвороб на ноги. Соком з квіток фарбують на зелено цукерки, а зварені квітки з галуном дають синє чорнило.

18) *Digitalis purpurea* L.—Наперстянка пур- пурова.

Зустрічається в лісах середньої і західньої Європи. Стеблина і листя знизу волохаті. Цвіте літом. Вся рослина дуже ядовита. В лікарування йде листя

(Folia Digitalis), зібране з диких рослин в пору цвітіння і скоро висушане на сонці; хоронять в сухім мешканні. Як лікарна річ, наперстянка вже давно звісна. Вживають для урівноваження діяльності серця, підвищення руху крові і як сечегонну зараду, тільки при хворобах на серце. В гомеопатії настойку з листя вживають (1—2 капел.) при подагрі, жовтяниці, пропасниці, тифусі, пухлятині та инш. В ветеринарній медицині теж користуються наперстянкою. Сіють в мягку землю, рядками через 3—4 верш.; можна сіяти між иншими високими рослинами, котрі в кінці літа прибирають; користуються аж на друге літо.

Другий вид наперстянки (*D. ambigua* Murr.) з більшим жовтjавим цвітом зустрічається в лісах і чагарниках середньої Європи, на Україні, Кавказі і в західній Сибірі.

19) *Erythraea Centaurium* Pers. — Сердушник, ясець.

Зустрічається на полях, в степах і чагарниках на Україні, Кавказі і безмалъ по всенькій Європі. Стеблина рівна, верх гиллякуватий, цвіт яскраво-рожевий. В лікарське діло йде трава (*Herba Centaurii*), котру збирають перед самим цвітінням. Збирають і сушать таким робом: виривають всю рослину з частиною коріння, вяжуть в пучки і розвішують в будинку, щоб вітер проймав, або на дворі в затінку; коріння і стебілля одкидають в аптеках. Вживають,

як заохочуючу до їжи і побуджуючу їжовариво зараду.

20) *Foeniculum off.* All.—Волоський укріп.

Цю городню річ найбільш культивують за-для насіння, ефірна олія з котрого має широкий споживок. Сіють весною. Насіння потребується на десятину в розкид 40—55 ф., а рядками 30—40 ф.. Землю любить вигнояну старим гноем, глибоко виорану, місце соняшне. Перший рік врожай буває не великий, а на другий і третій рік десятина може видати 50 - 80 пудів. Боїться великих морозів. Волоського укрупу є кілька сортів: німецький, парижський і флорентійський. Найлуччим признається німецький (фенхель) з великим насінням, але іднаково, він перероджується і дрібнішає. При лікаруванні вживають насіння (*Fructus Foeniculi*), як помякшуючу харкання і допомагаючу одділенню молока у матерів зараду.

21) *Fumaria off.* L.—Польова рута.

Ця бур'янина з синьовато-червоним цвітом часто зустрічається на городах, по садках, передогах і смітниках. Цвіте з травня до осені. В лікарування йде вся рослина, як в свіжій виді для готування соку (*Succus Fumariae*), так і трава (*Herba Fumariae*), зібрана в червні і скоро висушена. Настойку на воді і екстракт вживають, як легку заохочуючу до їжи зараду і при хорувані на живіт.

22) *Nyoscyamus niger* L.—Німиця.

Поважна лікарська рослина. Зустрічається на смітниках, по під тинами, по боках доріг і на полях. За границею її давно вже культивують. Потрібується її велика сила. Рослина дворічна. Сіють весною, рядками, рідко, на неvigнонім і соняшнім місці; стебллям і цвітом користуються аж на друге літо. Паранка звичайна. Листя збирають в пору цвітіння і скоро сушать в будинку, але так, щоб вітер проймав; здатне не більш, як на один рік. Насіння збирають спіле; воно має наркотичний запах і гіркато-нудний смак. Німицю (*Semina Nyoscyami* і *Folia Nyoscyami*) вживають в середину і поверхню, як вгамовуючу зараду, а часом при лікаруванні очей і операціях. Без лікаря нею не слідє користуватись, отруйна. Польова німиця (*N. agrestis* L.) ще не випробована медициною.

23) *Lactuca virosa* L.—Молочай.

Ядовита, брудка бурянина. Бживають зелень (*Nerba lactucae virosae*) і засохле молочко (*lactucarium*). Збирають листя перед самим цвітінням і скоро сушать. З цілої свіжої стеблини готують екстракт. Культивують молочай на сухих соняшних місцях, на неvigнонім ґрунті. Сіють рядками, рідко; полиють. Кращий буває, як сіяти в осени, а весною пересадити.

24) *Malva silvestris* L.—Калачики, проскурки.

Ростуть скрізь в дикім виді: на смітниках, коло доріг, але рідко зустрічаються масами в однім місці,

через що їх треба культивувати. Рослина любить добру не свіжо-вигнояну землю. Сіють весною, рядками. Квітки збирають, як тільки почнуть розцвітатись, а листя—в пору цвітіння. В медицині користуються листям (*Folia Malvae*) і цвітом (*Flores Malvae vulgaris*), як пом'якшуючою зарадою.

25) *Matricaria Chamomilla* L.—Роман.

Свідомством корисності культури цієї невеличкої рослини, що зустрічається у нас на полях, це те, що в Німеччині та інших державах нею засіяні великі лани. Роман через те, що поля починають краще обробляти, поступово зникає. Збирають і вживають свіжо-розпукий цвіт (*Flores Chamomillae vulgaris*). Дійсний роман зараз можна одрізнити по порожній одкритій квіточці од собачого (*Anthemis cotula*), цупкого. Роман на півдні можна сіяти з цвітіння до серпня, так як через 8 неділей після сіви він починає цвісти. Навіть можна сіяти вдруге після рано зібраного хліба. Посів можна не скородити, тільки завальцювати. Загаймо тільки зривати цвіт; для спору роблять залізний гребінь і користуються дитячим трудом. Зривають кількаразово. Зібраний цвіт розстелюють тонко в будинку, провітрюють і сушать. Збирати цвіт тра тільки в сухе надвір'я і пильнувати, щоб не було цвілі, а то втратить свої лікарні вдання. Пакувати теж тра в сухе надвір'я і в сухім мешканні. З цвіту вигонять ефірну олію. В хорошім товарі наші аптеки мають великий не-

статок. При лікаруванні роман вживають в середину, як потогонний засіб і од корчі, а поверньо-на обклади, примочки, полоскання. В народі він служить зарадою од кольки, простуди, ломця та инш.

Петр. Фармацевтична Громада рекомендує культивувати римський роман (*Anhemis nobilis* L.), вдання котрого луччі. Його культують в Німещині, Бельгії, Франції, Англії і північній Америці. Вживають тільки цвіти (*Flores chamomillae romanae* S. cham. nobilis). Десятина цього раману може видати 300 пуд. цвіту. Через 3—4 роки плантацію поновляють. При поновленні користуються одростками старих рослин. З свіжого цвіту выгонять ефірну олію.

26) *Melilotus coerulea* L.—Буркун-зілля.

Цей блакитний буркун розводять для готування зеленого сиру, котрому він придає запах і смак. Запах цієї рослини міняється згідно надвірю і годині дня. Стебілля і листя тільки що розцвітшої рослини служать гарною охороною од мілі. Для домашнього вживання досить мати в садку кілька рослин. Грунт не годиться дуже вигнояний, бо в такім разі рослина терає свій запах. Хороша медоносна трава і звичайна паша для скотини.

27) *Melilotus off.* Desr.—Буркун жовтий.

В дикім виді зустрічається безмаль по всенькій Європі, на Кавказі і захід. Сібірі. Цвіте з серпня до осени. Культивують за-для паши скотині і як

медоносну траву. На лікарство йде тільки дикий. Зривають вершки і цвіт в серпні місяці; сушать тільки листя і цвіт (*Nerba Meliloti*). Хоронять в добре заткнутім посуді. Вживають, як поверхню пом'якшуючу зараду.

28) *Melittis melssophullum* L.—Пахуче кадило, гадин язик.

Зустрічається в лісах і чагарниках середньої і півден. Європ. Стеблина рівна. Цвіте з початку літа. Великі квітки сидять по 1—3 в кутках поміж листям; віночок білий чи рожевий з пурпуровими плямами.

29) *Nicotiana Tabacum* L.—Тютюн.

Тютюн культивують за-для листя, котре курять, нюхають і жують. Низчі сорти (*N. rustica* L) звуться махоркою. Лікарський споживок цієї рослини невеликий. В аптеки йде сухе листя (*Fiolia Nicotianae*). Його часом вживають (водяний одвар) для клістирів, при вчадінні, утопленні, притисненні кгили, остовпінні. Нікотін вживають при нервовім серцестуканні. Рослина дуже отруйна; при назначенні лікарства з неї треба бути дуже обережному.

30) *Nigella sativa* L.—Чорнушка.

Чорнушку культивують масами, найбільш в Німеччині коло Ерфурта, за-для приправи їжи. В ап-

теки йде чорне кругловіте насіння (*Semen Nigellae S. Melanthi*); з нього добувають олію. Сіяти можна на невивгояні, але добрі землі; проривають, як буряки. Родить на десятині 75—115 пуд.. Насіння йде на посипку хліба, в капусту, на приправу мяса і сиру. Насінням користуються в ветеринарії. На дикій чорнушці (*N. arvensis L.*) листя менше.

31) *Oenanthe Phellandrum L.*—Кінський укріп.

Зустрічається в ровах, болотах і ставах. Розмножується паростками з коріння, котрий завжди на другий рік замирає. В діло йде насіння (*Semina Phellandrus S. Foeniculi aquatici*). Сіють зараз, як виспіє насіння на вохкім місці, а весною пересаджують. Можна розвести і з паростків. Рослина має горний запах. Вживають при зтяжнім катарі, через кожні дві години порошок з насіння, ступнево побільшуючу дозу з 5 до 45 дол.. Рогата скотина й овечки їдять гичку, свині—коріння, а для коней отруйна.

32) *Ocimum Basilicum L.*—Васильки.

Цю пахучу приправу вживають при купанні, виробі напиків з води, підмішують в табаку та инш. під назвою *Nerba Basilici seu Nerba Ocimi citrati*. Можна розводити на добрій, м'якій землі з нахилом на південь. З свіжої рослини вигонять ефірну олію.

33) *Papaver somniferum* L.—Мак.

У нас культивують кілька сортів маку: білий, сивий і видюк за-для насіння, з якого вигонять олію і готують всякі ласощі. З надрізу зелених маківок вибігає білий сік, котрий загусає, буріє і, засохнувши, дає опіум, отримуючий, як відомо, наркотичні вдання. В теперішні часи опіум, головним робом, добувається в Індії і Єгипті.

В лікарське діло йде тільки білий мак (*Semina Papaveris alba*). В південній Франції з макової олії виробляють мило. В простолюдності няньки і матері соком з зелених маківок годують дітей на спання; за цим необхідно тра стежити, бо цей нетям робить дуже велику ваду дитячому організмові.

34) *Papaver Rhoeas* L.—Мак дикий, самосійка.

Ця бурянина зустрічається в садках і на полях. В медицині вживають висушені пелюсточки з цвіту (*Flores Rhoeados*). В народі заварують і п'ють од кашлю. Сироп вживають (в Німеччині)—од кашлю, а головним робом в кондиторськім ділі—як фарбу.

35) *Petroselinum sativum* L.—Петрушка.

Відома всім городня річ. Культивують за-для нахучого листя і солодковатого, січного коріння. В лікарське діло йде і те й друге (*Fructus Petroselinii*) і ефірна олія (*Oleum Petroselinii*), вигнана з насіння. Насіння збирають з дворічних рослин. На-

стойку й порошки з насіння вживають, як сечегонну зароду.

36) *Pimpinella anisum* L.—Ганус.

Многолітня трава. Зустрічається у нас на перелогам, косяках і в чагарниках. Культивують на Подольщині, Курщині і Вороніжщині. Медоносна. Для лікування йде насіння (*Semen Anisi vulgare*) і ефірна олія з нього. Насіння повинно бути ціле, щільне і ретельно очищене од бур'яну. Звичайно ганус збирають, як головні парасольки петемніють, а вся рослина почне жовкнути; краще всього поперед зрізати головні парасольки, а потім зжати обережно і самі рослини і сушити в будинку, щоб вітер проймав. Молотять легкими ціпами. Насіння з головних парасольок йде на розводіння. Солому дають овечкам чи йде на підстилку. В Ерфурті, в Німеччині, з 1 пуда триння вигоняють 7 лот. ганусової олії. Сухе насіння хоронять в скринях. З 30—40 ф. насіння виходить 1 ф. ефірної олії. Ганус любить мягку, мергельно-вапняну, добру землю і соняшне місце. Сіють рядками через 4—5 верш., насіння йде на десятину приблизно коло пуда. Видає десятина 33—40 пуд. Землю орудь з осени (4 верш. глиб.), сіють весною після крумарування і скородіння. Полють і проривають. Можна сіяти після коринеплодів чи озимини.

37) *Pimpinella saxifraga* L.—Ганус кульшастий.

Зустрічається на перелогам, косяках і в чагарниках. Цвіте з кінця червня до осені. Листя зуб-

часте. Пахучі і прикрі на смак корінь і коренище (*Rhizoma seu Radix Pimpinellae*) вживають в медицині; збирають їх весною з старих рослин. З коріння і коренища добувають ефірну олію, лікарську смолу та інше. Корінь і настойку з нього вживають в середину для помякшення харкання і поверхню—для зубних порошоків і полоскання.

38) *Plantago lanceolata* L.—Подорожник.

Лікарське значіння цієї рослини тепер невелике. В народі вживають в середину при тяжкім диханні і трясці, а поверхню—прикладують до ран.

39) *Ricinus communis* L.—Рай-дерево, рицина.

Рай-дерево дає відому всім касторку, яку добувають з зерен (*Semen Ricini vulgaris*). Рекомендується культивувати на півдні, так як дуже важно мати свіже насіння, що не завжди буває з чужеземним. Порають рай-дерево, як качани (кукурузу). Любить добре вигнояну м'яку землю. Вулички між рослинами 1—1½ арш. Рай-дерево, як огірки, біб і тютін боїться заморозків. На десятину йде 5½ пуд. насіння. Видає десятина 35—100 пуд. Олії добувають домашнім способом 25 ф. зо 100 ф. зерна, а при луччих способах 40—45 і навіть 60 ф. Домашня виробка ось яка: зерна варять в продвженні 2 годин, потім 2 дні сушать на сонці чи на печі, лущать і знов варять—олія спливає на верх. Насіння сильно отруйне.

40) *Satureja hortensis* L.—Чебрець.

Лікарське значіння цієї трави мале. Збирають з цвітом. Засушена, під назвою *Herba Saturejae*, признається лікарями для купання; з свіжої трави з цвітом вигонять олію (*Olum Saturejae*). Медоносна. Грунтом не перебирає; місце любить тепле, соняшне. Рускою фармакопеею не прийнята.

41) *Sinapis alba* L., *S. nigra* L. і *S. Besse-riana*.—Гірчиця біла, чорна і сарептська.

Гірчиця дуже розповсюджена в культурі як за границею, так і в нас, на городах і полях. Ціль культури-добування олії й муки. І те й друге мають як медичні, так і інші приклади. Зернина білої гірчиці вчетверо більша чорної. Всім відому сарептську гірчицю культивують в Самарській і Саратовській губерні. німці-колоністи, а також і по інших південних і східних округах. Цей вид гірчиці роспочала культивувати вільна економічна громада. Перший сіб (1799 р.) зробив німець-колоніст Нейц в Сарепті. Ця гірчиця йде на європейські ярмарки в виді муки. З чорної гірчиці головним робом добувають ефірну олію. Культура її дуже розповсюджена в півд. Європі, де вона, як і в північній Африці і Малій Азії, зустрічається в дикім виді. Культура всіх трьох видів гірчиці іднакова. Біла і сарептська родять на всякій землі, і занадто вдаються на вигнояних суглинках і супісках. Землю оруть з осени, весною переорують і заволочують. Сіяти тра як можна раньше, щоб рос.

линки окріпли до появилення земляної блохи (*Haltica oleacea*), котра сильно спустошує молоді сходи. Од блохи оберегають сильним поливанням. Сіяти рядками лучче. Раз чи два просалують і де густо, проривають. При ряковім сіві на десятину йде насіння 18—25 ф. білої і 3—5 ф. чорної. Збирають зараз, як тільки стануть визрівати перші стручки, инакше стручки почнуть тріскатись і обсипатись. Снопи з неспілими стручками виставляють на ряднах на сонце. Насіння бережуть в посуді невеликими кількостями в сухім чи теплім мешканні; може сходити в продовженні 4—5 літ; засівати саме лучче дворічним. Родить на десятині до 64 пудів. В медицині користуються білою і чорною гірчицею. Насіння отримує в собі 30—36% олїї, котру добувають звичайним способом, як з конопляного сім'я чи льону. Опріч звичайної олїї чорна і сарептська гірчиця отримують в собі ефірну олїю, котру можна добувати парою з макухи, моченої в продовженні суток.

42) *Verbascum thapsiforme* Schrad.—Медвежаче вушко, дивина.

Вся рослина волохата. Цвіт жовтий. Ростає по сухих пісчаных місцях. Цвіте літом. Чай з цвітів в народній медицині вживають од кашлю. Для аптек збирають листя (*Herba Verbasci*) і цвіт без чашечок (*Flores Verbasci*). Цеї рослини є кілька видів. Не слідує збирати цвіту з чорної (*V. nigrum* L.). За границею у многих місцях медвежаче вушко культи-

вують. Сіють в осени лунками через $\frac{3}{4}$ арш., кладуть в кожну по кілька насіннин. Користуються аж на друге літо. Збирають щоденно, в сухе надвіря, як роса опаде. Сушать скоро, не дуже часто перевертають, щоб не помяти; складають в горшки чи коробки, а потім в скрині, обкладені з середини папіром і беруть в сухім місці. Насінням труять рибу.

Многолітні культури.

43) *Achillea millefolium* L.—Кривавник, серпоріз, деревій.

Ця бурянина розповсюджена по всій Європі і Сибірі. В лікарування йде трава, листя і цвіт (Herba, Folia, Flores Millefolii). Гарний народний засіб од живота і трясці. Кривавник зміщує в собі: ефірну олію (добувають з свіжої трави), гіркі речі ахілеїна, аконітну кислоту і мінеральні солі. Рослина любить добрий ґрунт. При сівбі насіння змішують з піском і сіють рядками, через 6 верш. рядок од рядка; рослини треба проривати, як буряки. Кривавник дає цвіт і насіння аж на другий рік. Можно сіяти з чим иншим, як клевер. Кривавнику є кілька видів: пахучий (*A. Ageratum* L.), шляхетний (*A. nobilis* L.) і дикий—чихавка (*A. Ptarmica* L.). Вживання всіх іднакове. Чай з дикого кривавнику (чихавки) в народній медицині—зарада проти сказу. В рускі аптеки йде тільки звичайний кривавник (*A. millef.* L.).

44) *Aconitum Lycostonum* L.—Цар-зілля, чорно-зілля.

Рускою фармакопеею ця рослина не прийнята, а в зах. Європі нею користуються так само, як і настушною. Культивується теж так само.

45) *Aconitum napellus* L.—Зозуліни черевички, борець.

Рослина сильно ядовита. З листя і цвітів (*Herba Aconiti*) гомеопати готують відомий аконіт. Великий споживок в медицині побуджує цю рослину культивувати. Вирощені в затінку і на маловигноянім ґрунті рослини так само придатні, як і дикоростучі. Розмножують з насіння і діленням кущів. Перший рік не користуються. Листя збирають з початку цвітіння і скоро сушать. Деякі фармакопеї рекомендують вживання м'ясистого коріння (*Tubera Aconiti*) з листям. Щоб рослини не вутіли од щорічного зрізування, необхідно давати на деякий час спочивок. Рослини вимагають переміжку на $\frac{3}{4}$ арш.; після садіння весною треба раз зворушити землю. Коріння викопують в осени. Листям користуються тільки в свіжій формі. Способи і протяг сушіння мають вплив на лікарські властивості. Гарна зарада при невралгії і острій ломцеві. В руках лікаря—це сильно цілючий засіб, а при домашнім нетямі не слід і братись, щоб не отруїтись. Вживають настійку на спирті і воді.

46) *Acorus Calamus* L.—Татарське зілля, айр.

Коренища й корінь айра (*Radix, Rhizoma Calami aromatici*) йдуть на всякі приклади. Хто має в городі болото чи рова з водою, неодмінно повинен завести в них цю рослину, з якої матиме не малу користь. Розводіння дуже просте: старе коріння ломають на кусочки і розсаджують по болоті чи рові. В осени

достають коріння, змивають болото і сушать. Садять в осени. В медицині аїр вживають в виді порошка, як засіб збуджуючий і скріплючий в животі та инш. Головний споживок знаходить собі коренище аїра і ефірна олія (*Oleum Salami*) з нього, що йде на вироб вин і всяких горілок; йде і в порфюмерію. Можно уповати на вивіз за границю.

47) *Adonis aestivalis* L.—Горицвіт червоний.

Зустрічається в середній і півд. Європі, на Кавказі і в Туркестані. Цвіте в кінці травня і в червні. В хмурний день і вечером цвіт закривається, а рано знов одкривається.

48) *Adonis vernalis* L.—Горицвіт жовтий.

Зустрічається на соняшних косяках, а найбільш на вапняниках в середн. Європі, Криму, на Кавказі, в захід. Сибірі і Туркестані. Культура цієї рослини дуже морочлива. Насіння треба сіяти на окремих грядках, а як рослини трохи підіймуться, то їх пересаджують на виготовлене місце, де на зиму їх треба прикрити. Можна розсаджувати і на другу весну вершків через 8 рослинку од рослинки. Користуються аж на 3—4 рік. Тепер ще є досить дикого горицвіту, а занадто в Приураллі, бракує тільки упорядкувати збирання. В аптеки йде корінь (*Radix Adonidis*) і трава (*Herba Adonidis vernalis*). В медицині настойку з трави на воді вживають для урівноваження діяльності серця, а *Adonidium*—при

лікаруванні хвороб на очі, як заглушуючу біль зараду. В народній медицині вживають при пухлятині (водянці) і од запую.

49) Agrimonia Eupatoria L.—Парило, парник.

Зустрічається по межах на полях, лісних галявах, косяках і чагарниках по всій Європі, на Кавказі, Алтаї і в Туркестані. Цвіте літом. Окрема квіточка цвіте лиш один день. Йде на виварування гладішок з під молока. Чай з висушеної трави (*Nerba Agrimoniae seu Eupatoriae*), зібраної в пору цвітіння, в народній медицині вживають при болісті печінки. Сіють рядок од рядка через 8—10 верш., а рослину од рослини після проривки кидають через 4—6 верш.. Поранка звичайна, сапують і проривають.

50) Ajuga reptans L.—Суховершки, гостровершки, горлябка.

Зустрічається на перелогах і в лісах. Коренище випускає многочиселні стелючі паростки; стебілля коротше верхніх квіточок. Колір цвіту блакитний, часом рожевий чи біловатий. Цвіте з травня до червня. Листям в народній медицині лікаруються од трясці, а цвітом і листям вкупі—од почечуя і зтяжкого ломця.

51) Althaea off.—L. Проскурняк.

Ця рослина росповсюджена по вохких місцях Європи, на Кавказі і Алтаї. За границею її вже давно

культивують масами. Більш користуються корінням (*Radix Althaea*), менш—зеленню і цвітами (*Nerba, Flores Althaea*). Всі частини вживають в виді чаю, як помякшуючу зараду та инш.. Любить добру землю з перегнойном, найбільш суглинисто-пісчану і вохкове місце. Розмножують з насіння і діленням кущів; садять рослину од рослини через $1\frac{1}{2}$ —2 ф. в глибоко перекопану землю. Вулички можна засівати чим иншим. Дуже виснажує землю, через що плантацію час од часу треба міняти. Корінням користуються з дворічних рослин, викопують в осени, бокове коріння очищають од кори, ріжуть на кавалки і скоро сушать при 35° Ц., не даючи пожовкнути. Лікарські вдання і споживок безмаль іднакові з калачиками.

52) *Althaea rosea* Cav.—Рожа, ружа.

В недавні часи у Франції стали вживати квітки рожи для фарбування вин на червоно. Це викликало надмірний розвиток культури червоної і чорної рожи як у Франції, так самої в Німеччині. Десятина може видати 100—300 пуд. цвіту. Умовини збуту у нас, запевне, инші—перш усього треба обрахувати, чи буде змисел культивувати цю рослину. Звычайно рожу розводять з насіння і поряють, як дворічну рослину; а доправди, то це рослина многолітня, її можна розмножати і діленням кущів. Насіння треба збирати з рослини з темним пвітом, а при наступних поколіннях немину́че треба знищувати рослини

з блідим цвітом. Для сівиби краще брати дворічне несліже насіння. Сіяти можна з травня до Петра в мягку, вигнояну рилу, рядками чи в розкид, і добре заборонувати. А пізніми жнивами молоденькі рослини пересаджують на виготовлене місце. Гарний врожай буває тоді, коли садити рожу на добре виробленім і вигноянім з весни пару. Перед садінням ще раз переорують і заборонюють. Відступи поміж рядками і рослинами роблять, беручи на увагу ґрунт і місце. На вигноянім і соняшнім можна садити рядок од рядка через $2\frac{1}{2}$ —3 ф., а рослину од рослини через 2 ф.. При пересадці треба бережно викопувати коріння і пильнувати за дрібними корінцями і волосинками, щоб не попусувати. Садять в мокре надвіря. На зиму рослини треба накривати листям чи чим иншим од морозу. Ранньою весною накривку знімають і рослини підгортають землею. Квітки збирають щоденно після полудня; збір кожного дня сушать окремо; при великій спеці треба сушити в затінку. На 1 фунт сухої порожньої рожи йде 800—1000 квіток з чашечками, а повної—600. Середній кущ з порожніми квітками дає 200—800 шт., а з повними—100—400. Культивувати цю рожу можна тільки там, де климат мягкий. В лікарське діло йдуть цвіти (*Flores Alceae roseae* инше *Fl. Malvae arboreae*) темночервоного коліру, зібрані з рослин, вирощених на неvigноянім ґрунті. Вживають в водних одварах для полоскання горла, а часом і в середину. В руску фармакопею не входить.

53) *Anemone hepatica* L.—Первоцвіт, проліска.

Зустрічається в тінистих лісах безмалю по всій Росії. Цвіте весною. Цвіти блакитні, часом червоні чи білі. Рослину перше вживали при болюх на печінку.

54) *Anemone nemerosa* L.—Куроліп.

Зустрічається безмалю по всій європейській Росії. Стеблина вигонить самотню квіточку з білими, поверх рожевими чи червоними 6 пелюсточками. Цвіте весною. Рослина в свіжій виді для скотини отруйна (в сіні не вадить). Вечером і в сире надв'іря квіточки закриваються.

55) *Anemone pulsatilla* L.—Сон, сон-трава.

Зустрічається в зах. і півд. Росії, на Кавказі і в Сибірі на одкритих горбах, в степах і гаях де-не де. Квіточка з 6 хвіялковими пелюсточками, вдвое довгими од пильняків. Рослина ядовита. При вживанні в середину свіжої рослини чи соку з неї робиться загноїння їжоварева і нирок. При необережнім повожденні може викликати на шкірі пухірі. Як яд всмокчиться, можуть наступити корчі і причини. Робить вражіння на серце, понижаючи його діяльність. В аптеки йдуть надземні частини рослини (*Herba Pulsatillae nigrae*), зібрані в пору цвітіння. Свіжа трава має пикучий смак і як потерти між пальцями,

то односить гострим, сильно колючим і викликаючим сльози запахом. В сухім виді ці природження в значній мірі тратяться. В народній медицині вживають од безсонниці у дітей і од трясці.

56) *Anemone silvestris* L.—Білий сон.

Зустрічається на перелогах, в степах і чагарниках по всій Росії. Цвіте в травні і червні. Коротеньке коренища випускає весною з прикорня кілька листочків і стеблину з квіткою в 3 листній обкладці і молочно-білими пелюсточками.

57) *Arctostaphylos Uva ursi* Spr.—Мучниця.

Приземкуватий завсіднй зелений кущ. Зустрічається на пісчаних місцях в лісах і чагарниках. Стеблина дуже гиллякувата. Листя збирають (*Folia Uvae ursi*) в пору цвітіння і сушать. Лічаться юшкою (*Decoctum foliorum uvae ursi*) з листя при загноїнні сечового пухіра, кровотічі з нирок, од глистів та инш.; одначе треба ухилятись надмірно великих доз, котрі можуть викликати тошноту і блювання.

58) *Aristolochia clematitis* L.—Филійник.

Филійник має тепер споживок безмалъ тільки ветеринарії; тоненькими його корінцями й зеленню (*Radix i Herba Aristolochiae langae vulgaris tenuis*) часами користуються і в медицині. Листя вживають з давних давен при лікаруванні пухірів. Рослина не

настільки розповсюджена, щоб розводіння її було лишнім. Рoste на соняшних пригорках, між камінням і в рідких чагарниках. Любить вапняний ґрунт. Рослина дуже ядовита.

59) *Aristolochia serpentaria* L.—Филійник американський, гадючий корінь.

Родина цієї рослини—гори північної Америки. Вона подібна на наш филійник, тільки всі її частини більші. Дійсний гадючий корінь в продажі трудно знайти, замісто нього продають звичайне коріння видів: *A. hastata*, *A. tomentosa* та инш.. В Європі гадючий корінь замінюють корінням: *A. longa* L. і *A. rotunda* L.. Ця рослина вимагає глибокої землі на сухім соняшнім місці; гарно росте на пісчаных берегах річок. Розмножується легко з насіння і діленням коренищ. В діло йде коріння (*Radix serpentariae*), як потогонна, сечегонна, а также кровогонна зарада при місячках. В руску фармакопею не включена.

60) *Arnica montana* L.—Бараняча трава, арника

Ця рослина зустрічається на горяних і лісних перелогах. В народі і в науковій медицині користується великою пошаною. Лікарські вданья мають зелень, цвіт і коріння (*Radix*, *Herba*, *Flores Arnicae*). Її можно ростити масами, але тільки на лісних пригорках з вохким ґрунтом. Де є такий переліг, його можно згорати і засіяти травою з приміссю $\frac{1}{3}$ арники.

Сіють під зиму, як тільки виспіє насіння, або весною; заволочують і привальцьовують. В такому разі уже на наступний рік буде луччий збір сіна; але траву не слідує допускати, щоб піднімалась високо, тра скошувати, нещільно. На другій рік можна збирати цвіти, а через 3—4 роки—викопувати коріння. Переліг з арникою перекопують на провесні чи пізно в осені, вибирають коріння і скоро сушать. Переліг знов можна засівати. Таким робом, кепські перелоги скоро получчають і оплатять процю. Культивувати арнику можна і в городі на грядках. Цвіт збирають в ясні дні і скоро висушують. Цвіту надкушеного і нерозпуклого зовсім не слід збирати. Щоб не зосталось в цвіті якого робачка чи комахи, його сушать на решетах над вугіллям чи в печі. Цвіти й коріння мають характерний запах і гострий смак; вони отримують в собі: арницін, чиньбарні речі і ефірну олію з запахом романа. Тінктуру арники, зготовану кількоденним варивом на легкім огні, одної частини арники з десятома спирту, вживають, як поверхній засіб при лікаруванні ран і забитого місця.

61) *Artemisia Absinthium* L.—Полинь.

Ця бурянина відома в народі як лікарська річ у всіх краях, користуються нею й лікарі. Рoste на сухих місцях. Найлучче культивувати її на косогорах, де заразом вона і ґрунт скріплює. Вкоренившись в ґрунті, полинь може оставатись кілька років, не

причиняючи ніякого клопоту; тільки треба заповняти галяви. Культура полиню у нас в сучасні часи тільки в рідких випадках може бути вигодною, так як ще дикого є досить. Зрізають верхню частину цвітучої стеблини і свіже, зелене листя з нижньої частини (*Herba seu Summitates Absinthii*). В лікарським ділі полинь вживають, як побуджуючу їжовариво-зараду, од трясці та инш.. Але далеко більше значіння має полинь в промисловості, з неї виробляють горілки і вина, за-для цього в деяких місцях у Франції полинь культивують масами. Полиньові горілки і вина, їдначе, дуже шкідливі для організма людини.

62) *Artemisia Cina Berg.*—Полинь цитварний.

Цей кущик росте в степах Туркестана. Має грубе, волохате підземне коренище. Для лікарування збирають квіточки перед самим цвітінням, що відомі в продажі під назвою «цитварного насіння» (*Flores seu Flosculi cinae*); з них виробляють гірку річ сантонін (*Santoninum*). Вживають од глистів. Великих доз треба ухилятись, щоб не отруїтись. В Ташкенті, Чикменті і Оренбурсі є фабрики, що вироблюють сантонін. Невважаючи, їдначе, на те, що сантонін в сучасні часи вироблюється тільки в Росії, наші оптові торговці, як здається, виписували його з Німеччини, себ-то, свій продукт купували за границею.

63) *Artemisia vulgaris* L.—Нехворощ, чорно-
біль.

В лікарування йде коріння і трава (*Herba, Radix Artemisiae*) цієї бурянини. Коріння викопують в осени, одділюють од коренища, котре одкидають, очищають од землі і, не миючи, скоро сушать і хоронять в добре заткнутім посуді. Годиться тільки на один рік. Траву (листя і верхки) збирають в пору цвітіння і так само скоро сушать. Траву вживають в народній медицині при жіночій хворобі, як зараду для побільшення місячки. Корінь і лікарства з нього вживають часом при чорній немочі, а также од кольки і як не йде місячка в пору.

64) *Artemisia Dracuncul* L.—Острогон,
турган.

В аптеки йде зелень з цвітом (*Herba et Summitates Dracunculi*), але мало. Ця рослина любить добру, м'яку садову невягнучу землю і соняшне місце. Коренище стелюче. Розмножають діленням кущів і з паростків. Довше 3 років не зоставляють на однім місці, щорічно пересаджують третю частину на нове місце.

65) *Arum maculatum* L.—Козяча борода.

Ця рослина поде-куди зустрічається в вохких лістяних лісах. Нею користуються, як домашньою зарадою (*Radix Aronis s Ari*), а загалом спрос на неї

невеликий. Куші збирають в кінці літа і очищають їх до-біла. В свіжій виді вони дуже прикрі і вадливі, через що цю рослину причисляють до отруйних, хоч яду найбільш отримує в собі листя. В сухій виді куш терає свою прикрість і стає стравким, в ньому зміщується до 70% крохмалю. Для лікарування рослину розводити не варт, але в вохкій місці садка з затінком можна посадити кілька рослин для власного споживку. Велика сила крохмалю наводить на думку, що наша козяча борода, так як і ост-індські види *Agave* і *Colocasia*, були-б здатні для готування арорута, цеї розповсюдженої підкріплюючої хворих речі. Давно дізнано, що в сухій виді ця рослина не отруйна, свіжа після переваріння так само терає свою вадність. В північній Славонії її збирають на зиму для їжи. Не слідує забувати про отруйність козячої борода в свіжій виді і оберегати дітей. Щавель скасовує вражіння цеї рослини.

66) *Asarum europaeum* L.—Копитець.

Зустрічається в лісах по всій европ. Росії, найбільш під орішиною. Коренище стелюче. Стеблина коротка, звичайно з двома блескучими зверху листками, між котрими виступає на короткій ніжці самотна квіточка. Цвіте весною. В медицині вживають коріння вмісті з зеленню (*Radix cum Herba Asari*), як побуджуючу, проносну і глистогонну зараду. Заохочує до їжи і одволює од піяцтва. Вегетинари вживають од корости і червів. Збирають

в серпні, як добре розіветься листя, сушать і труть на табаку.

67) *Asperula odorata* L.—Пахуча смілка.

Ця зелена з білим цвітом—зірочками травка зустрічається де-не-де в тінистих лісах. В аптеки йде трава (*Herba Asperulae odoratae* ише *Herb. Matrisylvae*). Розводять так: находять в липні чи серпні цю рослину, обережно викопують, щоб не попусувати стелюче коріння; садять, приєдвляють листям і поливають. Розвести можна і з насіння. Свіжа й висушена смілка головним робом йде на готування майських напиктів. Зрізують перед самим цвітінням всю рослину, сушать в затінку.

68) *Aspidium Filix mas* Sw.—Папороть.

Ця всесвітня рослина зустрічається в дикім виді в лісах і чагарниках, по затінках. В кого є хутір чи беріг тому радиться завести папороть. Весною чи літом, в сире падвіря, дістають сильніші рослини з коріняччам і садять на вохкім місці, де вони потім почнуть розмножотись самі-собою. Можна ще й так розвести: кладуть в посуд з водою торф'яну дернину і розсівають по ній спіле бадилля з листям; днів через 25—30 воно почне пароститись, після чого днів через кілька його садять вмісті з дернинами. В лікарування йде чоловіче коренища. Збирають в жовтні, очищають од коріння і луски, задню частину коренища одкидають, а передню з сидячими на ній

основами листя обережно сушать і потім хоронять в добре заткнутім темнім посуді. Запас коренища щорічно заміняють свіжим. Коренища (*Rhizoma Filicis*) і його ефірний естракт вже дуже давно вживають, як гарну зараду од глистів. Щоб вигнати цього чужоїда необхідно, зараз після заживку дати слабому що-небудь проносне; ідначе, рицини назначати в цім разі не можна.

69) *Atropa Belladonna* L.—Вовчі ягоди.

Зустрічається в лісах і чагарниках середн. і півд. Європи, в Криму і на Кавказі. Цвіте літом. Цвіти самотні, на коротких ніжках. Ягоди блескучі, чорні. Рослина дуже отруйна. В медицині користуються при лікаруванні хвороб на очі. В лікарування йде листя і молоде, м'ясисте і січне коріння (*Folia, Radix Belladonnae*), котре збирають в пору цвітіння і сушать в темнім місці. Цю рослину культивували ще в середні віки в монастирських і поміщицьких садках; і тепера, де не ходять діти, котрих могли-б спокусити ягоди, культивування її може бути присутнім. Любить глибоко зрушену вапнисту чи мергельну землю. Молоді рослинки вирощують на окремих грядках, а потім пересаджують; садять рідко, через 2 ф.. Коріння беруть од 3-х річних рослин.

70) *Betonica* off. L.—Буковиця.

Зустрічається на вохковатих перелогах і в лісах безмалъ по всій Європі, на Кавказі і в зах. Сібірі.

Вся рослина шершава. Цвіти сидять на вершку продовговатою головкою. Квіточки світло-пурпурові. В лікарування йде трава (*Herba Betonicae*), зібрана в пору цвітіння і висушена. В народній медицині вживають од кашлю і хвороб в грудях.

71) *Bryonia alba* L.—Переступень.

Рослина двохродова, як коноплі. Зустрічається в лісах і чагарниках середн. і півд. Європи. Квітки великі, блідо-жовті. Ягоди червоні. В лікарське діло йде корінь (*Radix Bryoniae*). Викопують в осени, обмивають, ріжуть на ковалки і скоро сушать. В недавні часи цей корінь признали гарною кровоосни-нюючою зарадою при уразових кровотіках. Корінем лікарується народ і часами собі шкодить, бо він отруйний.

72) *Carlina acaulis* L.—Відкасник.

В лікарування йде коріння (*Radix Carlinae*) цієї рослини. Перше вона славилась, а тепера нею користуються тільки ветеринари. Коріння—добра пожива для свиней. Тим, хто збирає коріння, щоб забезпечити собі невиводний врожай, родиться садити назад непотрібні частини рослини.

73) *Sium carvi* L.—Тмін, жмін.

Зустрічається на перелогах і культивується на полях. Цвіте в травні, червні. З насіння вигонять

олію, котра головним робом йде на виріб горілок і в парфюмерію. В лікарування йде олія і насіння (*Fructus Carvi*). Вживають як побуджуючу їжовариво зараду. Рослина землею не перебирає, дуже гарна родить на пісчанім і вапнянім суглинку і при тім на вохковатім. Любить не свіжо-вигнояну землю і глибоку оранку. Сіють весною, міленько, перед чим землю раз або два крумерують і боронують. У Франції, коло Бургейля, щоб хмін не займав поля дві літі, садять в осени лунками. Ворущіяна землі усилює ріст, а ще лучче, коли підгорнути. Васенній сів дає насіння аж на друге літо, осінне садіння прибутніше. Можно сіяти і поміж яровиною, як клевер. При сіві в розкид йде насіння на десятину близько 6 ф., а рядками—менше. Збирають не зовсім спілий, снопи ставлять вверх волотками вистигаты. Снопи перевозять рано чи в ночі. Німці признали найлуччим сіяти поміж рапсом чи яровиною, рядок од рядка через 1 ф..

74) *Chelidonium majus*. L.—Молочай, глекопар.

Ця бурянина зустрічається найбільш на гнойовиськах. Грунт любить помірно м'який, вигнояний і і місце з полузатінком. Засівають лунками через $\frac{1}{2}$ арш.; рослиники проривають, а вулички просапують; в сухе літо поливають. В лікарських справах вживають зелень, листя і стебілля, котрі збирають з початку цвітіння. При сушінні тратить коло 80% молочного соку, через що вживають свіжозібрану

траву. Сік молочая отримує в собі сильно проносні і сечегонні вдання. В народі вживають од бородавок.

75) *Cichorium intybus* L.—Петрові батоги.

Ця рослина зустрічається на смітниках, коло доріг і по ровах. Цвіте літом і в осени. Медоносна. В аптеки йде коріння (*Radix Cichorii*) з дикоростучих рослин. Коріння і екстракт з нього вживають часами, як гірку річ, для побудження роботи їжоварива. Культивують за-для коріння, котре йде на готування кофія. В Ярославській губ. щорічно виробляють близько 400000 пуд. сухого коріння. Розводять з насіння, котре сіють на виготовлене поле в цвітні. Грунтом не перебирає, але лучче всього родить на м'яккім супіску. Оранку потребує глибоку. Коріння збирають в кінці серпня чи з початку вересня. Середній врожай коріння близько 1000 пуд. з 1 десятини. Вивозиться за границю.

76) *Circaea lutetiana* L.—Відьмине зілля.

Ця рослина зустрічається по вохких і тінистих місцях середн. і півд. Росії, на Кавказі і в Сибірі. Стеблина прямостійна, листя з рідкими зубчиками. Дрібненькі, з початку рожеві, а потім білі квіточки зібрані щіточкою. Таке ім'я носить в честь грецької міфологічної відьми Цірцеї. В перші часи мала великий споживок в простолюдності при закляттях та інших забубонах.

77) *Colchicum autumnale* L.—Зимовик, дикий шафран.

Рослина дуже ядовита. Зустрічається на вохких перелогах в Криму, Польщі, на Волині, середн. і півдн. Європі та инш.. Так як її сильно вигублюють в дикім виді, то для лікарських справ її треба розводити. Культивують так само, як арнику. Насіння збирають весною, а цвіти в осени. Коріння викопують після того, як збируть сіно. В лікарських справах у нас користуються тільки насінням (*Semina Colchici*), в інших краях і корінням, а в Франції й цвітами. Насіння беруть в склянім посуді і щорічно замінюють свіжим. З свіжого коріння готують вина, настойки, одет і екстракт. У Франції користуються сушеним корінням.

78) *Convallaria majalis* L.—Конвалія.

Ця відома всім рослина з пахучим цвітом і гарною зеленню зустрічається в лісах і чагарниках безмалю по всій Росії. Всі частини рослини ядовиті. Культивують на м'яккім, помірно вохковатім, гноянім ґрунті. Розводять з коренища; садять в осени грядками, через 4—5 вершків рядок од рядка і рослину од рослини. Можно розводити і з насіння, але загайна справа: сіють в розсадник, а потім пересаджують. В лікарських справах у нас користуються цвітами (*Flores Convallariae majalis*), свіжими і сушеними, а в інших краях травною *Herba C. m.*) і коренищем (*Rhizoma C. m.*).

79) *Crocus sativus* L.—Шафран дійсний.

Висушені мордочки цвіту шафрану вживають в медицині і кондиторським ділі. Цвіте в осени, а насіння виспіває аж на наступну весну. Один вид шафрану, а йменно Паласа (*C. sativus* L. var. *pallasii* Salmalh.) зустрічається по степах в Криму; він дуже подібний до дійсного шафрану, тільки всі частини його менші і мордочки цвіту коротші. Збирають в гарне надвіря, як тільки розпуститься квіточка, вищипують мордочки, складають в купки не більш фунта і сушать на волосянім ситі в продовженні 15 хвилин. Сухий шафран складають в мішечки чи дерев'яні скриньки. На 1 ф. сухого шафрану йде 200000—275000 квіток. Десятина може видати 48 ф. сухого шафрану. Шафран культивують в Іспанії, Франції, Австрії, Італії і Америці. В Бакинській губ. його культивують в 12 селах, де збирають щорічно близько 200 пудів. В Нюренберсі (Німеччині) багацько підроблюють фальшивого шафрану, підмішують нагідки та крокіс. Культивувати можна там, де виноград виспіває. Грунт любить м'який, без бур'яну. Садити починають з вересня; рослина од рослини через 3 дюйми і до 6 дюйм. в глибину. В половині падолиста перестає цвісти. Весною плантацію перекопують, а літом сполкують бур'ян. На другий рік шафран дає втрое більше цвіту. Після трьох років звичайно рослинки викопують, просушують в затінку і кращі знов садять. Саме більше їм дають сидіти в землі 4 роки.

80) *Cynanchum vincet .R. В.*—Бородач.

Зустрічається в чагарниках і лісах середн. Європи, на Кавказі і в зах. Сибірі. Колір цвіту жовтоватобілий, запах бриджий. Рослина ядовита. Корінь (*Radix Vincetoxiasem Hirundinariae*) вживають, як проносну зараду і дають на блювання. Має великий споживок в ветеринарії.

81) *Cynoglossum off. L.*—Чорно-корінь.

Стеблина м'яко-пушиста; листя покриті сіроватим волокном. Квіточки в довгих закрутках, зібрані віничком на верхку стеблини; віночок темно-пурпуровий, рідко білий. Орішки приплюснуті і з колючками. Росте по смітниках, коло доріг і по косогорах. Корінь і трава мають споживок в народній медицині. Свіжою травою виводять мишей і щурів.

82) *Dictamnus Fraxinella Pers.*—Ломиніс.

Ця рослина з гарними цвітами і пахучим листям часто розводиться в садках для краси. В лікарських справах вживають шкурку з коріння (*Radix Dictamni albi S. off. S. Fraxini pumilae*), яку перше признавали потайною зарадою од чорної немочі. Коріння збирають весною, з грубого здирають шкурку і сушать. Розводиться з насіння, котре може пролежати до сходіння цілий рік в землі. Відступи між рослинами—9 верш.. Ломиніс зустрічається в дикім виді по затінках в листвяних лісах. Цвіт і листя мають цитриновий запах. В Сибірі вживають чай з

доминоса. Шкурка з коріння має прикий козлиний запах, вживали перше од трясці, золотухи і чуми. Многочиселні залозки, що находяться на вершку доминоса, отримують ефірну летку олію; в тепле і сухе надвіря ця олія обертається в пару і робить собою кругом рослини небачну хмарку; як приторкнутись запаленим сірником, то вона спахує і горить яскраво.

83) *Gentiana lutea* L.—Товстуха, тирлич.

Зустрічається на горах середн. і півд. Європи і в Сібірі. На неї великий спит. Корінь (*Gentianeae* инше *Radix G. rubri*) в медицині вживають як гірку, заохочуючу до їжи і побуджуючу діяльність їжоварива, зараду. Розводять з насіння, лучче всього починати з осени. В полузатінку роблять грядку з лісної землі з піском, втуптують, сіють насіння, придавлюють, злегенька прикривають землею, а потім застеляють мохом. Весною, як почне сходити, мох знімають і кладуть хмиз для затінку. Молоді рослини розсаджують в другу грядку з мягкою землею через 2—3 д. і зоставляють тут до весни; потім їх знов розсаджують через 1—1¼ ф. в звичайну, глибоко перекопану землю. Коріння викопують пізно в осени чи на провесні. Гарна декоративна рослина, досягає 1½ арш. заввишки. Починає цвісти на 3—4 літо. Товстух є кілька видів: *Gentiana panonica* L., *G. punctata* L., *G. acaulis* L...

84) *Geum urbanum* L.—Гребінник, вивішник.

Зустрічається по всій Європі в лісах між кущами, коло хатів і в інших місцях з затінками. Має трохлописте листя; коренища в виді невеликої моркви з численними корінцями. Лікарське значіння народ признає за коренищем. (*Radix Caryophyllatae* инше *R. Gei urbani*), котре збирається з рослин з сухого місця; його засушують, після чого воно стає червонобурым; воно має саморідний приємний запах і гірковатий смак. В торгівлю йде мало. Сіяти можна зразу в ґрядки. Корінням користуються аж через кілька літ росту. Любить сухе невисоке місце.

85) *Glycyrrhiza glabra* L.—Солодковий корінь, солодка.

Многолітня травяниста рослина з прямостійною стеблиною і довгим грубим корінем. Має біловато-хвіляковий чи синьоватий цвіт. Зустрічається в півд. Європі, Криму і на Кавказі. Солодкий корінь і густий його сік вживають в медицині од кашлю, простуди та инш.. Є ще два види солодки-руська і уральська. Уральська зустрічається в степах на півд. Уралі, в півд. Сибірі, Туркестані і Монголії. Дуже багато цієї солодки вивозять в Китай. Лікарські вдання її такі самі. В Баварії культурою солодки зайняті сотні пішаків. Італія, Іспанія, Франція, Сіцилія і инші краї вивозять велику силу солодки і екстракту з неї. Культура дійсної рослини притягає

до себе велику повагу. В низовинах і рівнинах Дніпра можна було-б скористувати наносний ґрунт культурою солодки і мати не малий прибуток. Розмножують з насіння і кусками коріння, садять всторч, як хрін, через $1\frac{1}{2}$ —2 ф., ранньою весною. Землю орудь в осени, весною вигноюють і переорудь. Польють і підгортають. Корінням починають користуватись аж на 3—4 рік. Викопувати дуже турботно і загайно. На пів-версти од Єлісаветполя є лакрична фабрика чужеземця Бліса, котра свідчить, що у всякім ділі на рускім ґрунті необхідні чужеземці. Як вони більшу частину користи заберуть, то тоді тільки починає думати руский чоловік, на долю котрою зостаються недоїдки. Солодка в Росії дуже знищується і культура її на півдні тепера стає необхідною.

86) *Gratiola* off. L.—Золототисячник, дри- сливець.

Зустрічається на вохких перелогах, берегах, ровах та інших місцях. В лікарування йдуть всі частини рослини (*Herba*, *Radix Gratiolae*), зібрані в пору цвітіння. Розмножується лехко з насіння. Заготовляють ямки рядками через 6 верш., кладуть в них по кілька зернин і загортають. Любить вохкий ґрунт. Ростом досягає 6 верш. В руску фармаконей не включена.

87) *Helleborus niger* L.—Морозник чорний.

Зустрічається в лісах на горах середн. Європи і де-не-де в лісах на Україні і Польщі. Цвіте зимою і на провесні. Рослина ядовита. Коренища і коріння (*Radix s Rhisoma Hellebori nigri*) вживають в медицині. Збирають в марці місяці. Розмножують діленням кущів. Може рости в садку, тільки не на вох-нім місці. Користуються аж на третій рік. Не слідуює тривожити сапуванням.

88) *Helleborus viridis* L.—Морозник зелений.

Зустрічається в дикім виді в середн. і західн. Європі. Рослина походжа на попередню, тільки лист має м'якший і світліший. Лікарські вдання такі самі.

89) *Hesperis matronalis* L.—Вечерниці душисті.

Ця рослина зустрічається в чагарниках і лісах. Стеблина рівна, на верху гиллякувата; листя зубчасте; квіточки бузкові, часом червоні чи білі, пахучі; стручечки кругловасті, на ніжках. Вечером більш пахнуть, ніж днём.

90) *Humulus lupulus* L.—Хміль.

Має два роди—чоловічий і жіночий. Зустрічається в дикім виді в чагарниках, лісах і на берегах річок. Культивується масами, переважно жіночий рід, за-для шишочок, що йдуть на пиво, а в

медицині вживають пилок, висіяний з сухих шишочок, під назвою хмелевої муки чи лупуліна, як заспокоючу зараду. Хміль вдається на всякім ґрунті, але найбільш любить глибокий чорнозем, помірно вохковатий, що отримує трохи глини і піску; місце соняшне.

91) *Hypericum perforatum* L.—Святоянське зілля.

Зустрічається на перелогах і в чагарниках. Цвіте літом. Народ вживає од деяких хвороб. Дає дві фарби: одну жовту, що розходитьсь в воді, а другу червону, смоляну, що добувають спиртом; обидві фарби йдуть на красіння тканин.

92) *Hyssopus off.* L.—Исоп.

Зустрічається в дикім виді. Розводилась ще в середні віки. Зелень (*Herba Hyssopi*) і тепер йде в аптеки. Збирають м'які верхки цвітучих гіллячок. Любить сухе відкрите місце с посереднім ґрунтом. Розводять з насіння; сіють попереду в грядки, а потім розсаджують рядками через 6—8 верш. Можна розводити і діленням кущів. Є два види цієї рослини: одна з синім цвітом, а друга з рожевим; обидва види мають іднакові вдання. З трави вигонять ефірну олію, що йде в косметику і на готування вин. Олію вживають од задишки.

93) *Hydrastis canadensis* L.—Жовтий корінь.

Батьківщина цієї рослини Північна Америка, де вона росте по лісах; походжа трохи на курачу сліпоту. Стеблина досягає 6 верш. заввишки, покрита волосинками, без гиллячок, виганяє два лопчастих листки з 3—7 сегментами, подібними на лист хмелю; завершується одною білою квіткою. Ягода має вид малини з кількома камінчиками, в котрих по 1—2 насіннині. Для лікарських справ йде висушене коренище (*Rhizoma Hydrastidis*) з корінням. Рослина собою пахуча, на смак гірка. Вживають при кровотічі. Не вважаючи на розповсюдність в Північ. Америці і великий вивіз звідти, жовтий корінь культивується і в Англії. В Росії робить спитки В. К. Ферейн в Московській губ.. Розводіння цієї рослини бере на себе велику повагу, бо в Америці вона почав зникати. У нас може рости в лісах чи під деревами в затінках; землю любить м'яку, торф'яну. Засівати в розсадник, а потім пересаджувати. Спитки має робити Ботаничн. Сад Імп. Петра Вел. в Петрограді.

94) *Jnula Helenium* L.—Оман.

Зустрічається на городах в дикім виді. Грубе коренище (*Rhizma Helenii*) цієї рослини вживають, як сечегонну і пом'якшуючу харкання зараду, а вироби з неї йдуть на інші речі. Оман культивують в Німеччині (Каледа), Голандії, Англії і Швейцарії. Грубе коріння потребує доброї, помірно-вохкватої

землі, а вишина (до 5 ф.) рідкого садіння, через 2 ф. Сіють в росадник і розсаджують того самого літа, або аж на другу весну. Полюють і підгортають. Щоб коріння було більше, рослині не дають цвісти, лопуцьки з завязю цвіту зрізають завчасно. Коріння викопують дворічних рвслин, грубше розрізають і скоро сушать. З свіжого коріння готують варення. В брагу виноградного вина кладуть коріння омана і одбирають вино для зміцнення іжоварива.

95) *Iris florentina* L.—Півники.

Ця рослина розповсюджена в середн. і півд. Європі, півнич. Індії і Криму по сухих місцях. В аптеки йдуть корінь і коренища (*Rad. i Rhiz. Iridis*), зібрані в осени і висушені. Головний споживок півники находять в парфюмерії. Розводять, як татарське зілля, кусочками коренища. Люблять важкий ґрунт. Півників є кілька видів: німецький, низький, сібірський та инш., вдання всіх безмалъ іднакові.

96) *Laserpitium latif.*—L. Стародуб, лиходійна трава.

Зустрічається в лісах і чагарниках. Цвіте в липні—серпні. Дас гіркий корінь (*Rad. Gentianae albae s. Cervariae albae*), котрий найбільш вживають в ветеринарії. Культивують так само, як дягиль. Любить сухе місце і добру землю.

97) *Lavandula spica* D. L.—Лаванда.

Користуються цвітом і зеленню (*Flores et Herba lavanbulae*), з котрих готують дорогі духи. Італійська лаванда дуже боїться морозу, але зате вона більш отримує цілісних вданнів і більш пахуча, ніж французька. У нас обидві культивуються (наприкл. в саду Браницької в Білій Церкві і в Лубнах у Біляйіва). Німці більшу перевагу дають французській лаванді. З 1 ф. сухого цвіту італ. лаванди виходить 5 драхм ефірн. олії, а з французької 2 драхми. Розмножують з насіння; сіють в осени в розсадник, а на другий рік розсаджують рядками через 1 ф. рослинку од рослинки. Поновляють плантацію через 4—5 років. Можно розводити і діленням кущів. Сапують і сплюють бур'ян. Любять глибоку оранку. Траву і цвіт збирають перед самим цвітінням і сушать в затінку. Лаванда завсіди знайде збут.

98) *Lilium candidum* L.—Крин, лелія біла.

Одна з найкращих садових лелій. Стеблина гола. Великі, пахучі квітки зібрані щіткою. Цвіте літом. З свіжого цвіту готують олію (*Oleum lilium alb.*). Цибуля цієї рослини слизька. Її варять в воді чи молоці, печуть в золі, змішують з свинячим салом і прикладають в виді пом'якшучої заради до чиряків, волосу (ногтоїд) і до гнояних ран.

99) *Linaria vulgaris*. М. У.—Дзвіночки, зай.
ців льон.

Збирають зелень і цвіти (*Herba Linariae*) цієї рослини, що часто зустрічається на парках. Любить сухий ґрунт і відкрите місце. Розмножується з насіння.

100) *Lychnis viscaria* L.—Смілька.

Зустрічається на перелогах. Стеблина гола, наверху під вузлами дуже липка; листя довге, вузьке. Квітки зібрані митлою; віночок коронкою; пелюсточки червоні. Цвіте з травня до липня. Липкі місця обороняють цвіти од комах. Рослина дає бджолам мед, обніжку і клей.

101) *Levisticum* off. К.—Любисток.

В аптеках вживають тільки корінь (*Rabix Levistici*), а в ветеринарній медицині часто і листя (*Herba Ligustici* s. *Levistici*). Любисток часто зустрічається на городах. Корінь викопують весною. Потрібує доброго ґрунту. Відступи між рослинами 12—14 верш. Розмножується діленням кущів. Дуже пахуче насіння не знаходить собі споживку.

102) *Melissa* off.—L.—Мята цитринова.

Гарна медова, лікарська і пахуча рослина. В лікарські справи йде листя (*Folia Melissaе*). і ефірна олія. Листя збирають в пору цвітіння, скоро сушать в затінку, на вітрі. Ефірну олію вигонять паром з

свіжого листя і верхків, котрі збирають 2—3 рази на літо. Розводять з насіння чи діленням кущів. Сіють в осени прямо в ґрунт, або весною в розсадник і пересаджують. Ґрунтом не перебирає, але щоб мати гарний врожай і більш пахучу траву, то треба вибрати для неї соняшне місце, з м'якою, родючою, трохи сухою землею.

103) *Mentha sativa* L.—Мята.

М'яти є кілька видів: лісова (*M. silvestris* L.). садова (*M. sativa* L.). холодна (*M. piperita* L.) та інші. Велика річ ретельне сортування. Руска недбалість про це звела на безцінок руску м'ятну олію і саму м'яту. Холодна м'ята буває двох сортів: біла з зеленою стеблиною і чорна—з темночервоною стеблиною і чорнішою зеленню листя. Розводять м'яту діленням кущів і паростками. З насіння не розводять через те, що перероджується в інший вид. Любить теплий і вохкий клімат, соняшне місце, родючий м'який чорнозем чи пісчаний суглинок. Кепсько родить на валляниках і тінистих місцях. Найлучче садити після коринеплодів. Садять ґрядками по 4 рядки через 6 верш. рядок од рядка і рослину од рослини. Траву збирають два рази в літо: перший раз перед цвітінням, що буває в саму спеку, а через що ґрядки після збору тра поливати; другий збір роблять в осени. При одноразовім зборі зрізають траву в пору цвітіння і мають продукт дещо луччий. Зрізану траву в'яжуть в невеличкі пучки, зв'язують попарно

і вішають на жердинах, на горі. Літом добре сохне, а в осені сушити можна тільки на хатній теплій горі. Добування з мятної трави олії дуже корисна річ; але це діло складне і незручне тому, в кого мало трави. Ефірну олію вигоняють з сухої трави не чавлінням, а парою в дистиляційних приборах. Мята часто вимирзає і вимокає, а найбільш на старих грядках. А щоб цього не було, то треба щорічно третю частину грядок старої мяти знищувати і засаджувати нові грядки. Підгортання літом корисне. На зиму од морозу треба прикривати листям і хмизом; гнойом не годиться, може випріти. Лікарське значіння мяти велике і многочиселне. Її вживають, як побуджуючу зараду, проти блювання, для зміцнення нервів і в животі і при болях уразу. З мятної олії вироблюють ментол (*Mentholum*)—рід камфори. На виробі ментола в теперішні часи найбільш йде японська мята (*Mentha japonica*), розводіння котрої для цієї цілі дуже бажане.

104) *Menyanthes trifoliata* L.—Бобовник, трифолія.

Болотяна рослина з стелючим коренищем. Листя йде з прикорня. Цвіти зібрані вверху стеблини густою довгою щіткою, білі. Цвіте в травні-червні. Листя йде на пиво і в лікарування (*Folia Menyanthis*), як гірка річ, побуджуюча діяльність іжоварива. Його збирають до і в пору цвітіння, розстелюють тонкими шарами на папірі в будинку, але так щоб вітер проймав, і скоро сушать.

105) *Narcissus pseudon.* L. і *N. poetisus* L.—
Нарцис.

Ціє рослини є два види: жовтий (*pseud.*) і білий (*poeticus*). Зустрічається в дикім виді в півд. Європі і Закавказзі. Розводиться в садках. Цвіте ранньою весною. Декокт з цвіту і коріння дають кволим при загноїнні легкого і деяких випадках кривавиці. Коріння, що продавалось в аптеках під назвою *Radix Narcissi Sylvestris* v. *Buldocedii*, тепер мало йде в діло. Коріння можна викопувати у всяку пору, а щож торкається цвіту, то його двома способами поряють: скоро сушать в печі, в вільнім дусі і на дворі, щоб він стратив свій холір і став зеленуватим. Вданья їх різні. Сушаним цвітом в печі лікаруються од трясці.

106) *Orchis militaris* L.—Любжа.

Ціє рослини є кілька видів. Один з найбільших зустрічається на перелогах і в чагарниках на Україні, в Криму, на Кавказі і в Сибірі. В лікарування йде молодий, пупкий корінь (*Tubera Saler*). Вживають, як зараду при отруїнні і хворобах на живіт; часом, як стравку річ, з вином і молоком. Розводять з коріння (куща). Садять в осени, як шафран, в помірновохковату землю, вигнояну за рік вперед, заглібшки на 3-4 д., і занехують на 2 роки, тільки сплюють бур'ян. Можна і так культивувати, як арнику. В кінці другого літа, після поранки сіна, викопують, скородять і знов садять. В осени цього

робити не слід, бо тоді любжа саме пускає паростки. Не слід давати рослині цвісти, а то коріння втирає силу. Одібране коріння обмивають в воді, знімають верхню бурею шкурочку, саджають на кілька хвилин в кипіток, обтирають і сушать в теплім мешканні. Вялий корінь, з котрого виросла цвітуча стеблина, не годиться для діла. Сухе коріння любжи йде в продаж під назвою «салеп». Найбільш салепа добувається в Малій Азії, звідки його везуть на європейські ярмарки. Цей, так називний «левантійський» салеп, одріжняється од європейських сортів (французького і німецького) тим, що він більший і темніший.

107) *Origanum majorana* L.—Майоран.

Майоран під назвою *Herba Majoranae* вживають для обкладів і хування, рідко—в середину. Має гарний запах і смак. Любить легку, добру землю на соняшнім місці. Сіють весною в розсадник і поливають, поки не зійде; розсаджують в травні через 3—4 верш. рослинку од рослинки. На півдні можна сіяти прямо в грядки і обробляти, як буряки. Зелень зрізують в пору цвітіння, в липні—серпні, і сушать. Листя й бруньки йдуть на приправу до мяса і риби, а також на впріб пахучого оцту. З насіння вигоняють ефірну олію (1, 9%).

108) *Origanum vulgare* L.—Материнка.

Звичайно материнка росте по косогорах на пролісках і світлих гаях, а найбільш на вапняниках.

Збирають цвітучі верхи стеблини (*Nerba Origanī vul-garis*), вяжуть в невеличкі пучечки і сушать на горі, але так, щоб вітер проймав. Ефірну олію добувають з свіжої трави. Лікарське значіння материнки тепер невелике. Ефірну олію вживають тільки по-верхньо, як болевгамовуючу зараду, а в народі—це дуже разповсюджений засіб при хворобах на зуби.

109) *Paris quadrif* L.—Воронє око.

Зустрічається в лісах і чагарниках. Коренище довге, стелюче; зверху зеленовато-жовта квіточка. Цвіте в травні—червні. Ягода синьовато-чорна. Всі частини рослини ядовиті, а занадто ягоди.

110) *Platanthera bifolia* R.—Любка, нічна хвіялка.

Зустрічається в лісах і чагарниках на Україні, в Криму, на Кавказі і в Сибірі. Цвіт білий з зеленоватим одтінком, дуже запашний, а надмірно ніччу. Цвіте в травні—червні. Споживок такий самий, як любки. Культивується теж так само.

111) *Polygonum bistorta* L.—Левурда, ракові шийки.

Зустрічається на вохких перелогах. Коренище довге, стелюче, криве. Прикорневе листя довге. Околоцвітник рожевий чи білий; пиляків 8; цвіте в червні—липні. В лікарське діло йде коренище (*Rhizoma Bistortae*), котре збирають весною чи в осени і сушать. Коренище здатне для вичинки шкір і на фарбу.

112) *Polygonum Hydropiper* L.—Гірчак.

Зустрічається на вохких ґрунтах. На смак листя і насіння гіркі і пікучі. Цвіте з червня до осені. Рослину цю вживають в свіжій формі, так як при сушці її сила терається. Вживають в середину, як побуджуючу зараду, а поверхньо—як гірчицю. Сік рослини в чистій формі чи розбавлений водою—гарна зарада для витягування гною з атонічних нарізів, для оддалення закростених частин і для затягування ран. В ветеринарії гірчак прикладають до пухлятини. Декокт з гірчака вживають при полосканні горла, завалках в горлі і при пліснявиці; ним навіть заспокоюють зубні болі. Не слід змінювати цю рослину з *Polygonum persicaria* і *Persicaria amphyd.*; цвіт останніх має вид довгого, цупкого волотка, тоді як у гірчака це волоття невелике і тонке. Народа, що була в 1915 р. при Департ. Землеробства, цю рослину признала вартою збирання, так як вона здатна почасти замінити собою американський вид *Nydrastis canadensis* (див. стор. 49). Так як гірчак рослина однолітня, то частину його треба залишати на насіння для самосіва, або для збирання і розсівання по болотних місцях.

113) *Primula* off. jascq.—Сорочі лапки, божі ручки.

Зустрічається в лісах, на перелогах, косогорах і по боках доріг. Цвіте в цвітні і травні. В аптеки

йде цвіт (*Flores Primulae veris*), але мало. Народ цвітом в виді чаю лічиться од кашлю і простуди.

114) *Pulmonaria off.* L.—Медунка.

Цю знамениту рослину ще не дуже давно вживали при хворобах на сухоти. Її можна розводити в рідколіссі,—посадити і дати їй здичавіти. Зелень (*Nerba Pulmonariae maculasae*) збирають в часи цвітіння. Медоносна. Любить вапняний ґрунт.

115) *Pyrethrum carneum* B., *P. roseum* B.— Роман перський і кавказський.

Обидві рослини дають всім відомий «перський порошок». Вони розповсюджені за границею з 1853 р. за поміччу німця Фелькерзама з Курляндії, которому дісталось насіння од булого намистника Кавказа князя Воронцова. Ці многолітні трави досягають ростом до 1 ф., з гарним надрізним листям і по одиночними великими квітками. В сухім, соняшнім місці вони гарно ростут на всякім ґрунті. Але для здобичі порошка, їх треба ростили тільки на невивноннім ґрунті. Культура дуже проста і не одріжняється од культури інших многолітніх рослин. Власне кажучи, роман-многолітній получагарник. Поновляти його лучше всього насіванням. Сіють в розсаднику весною, а як трохи підросте, то розсаджують грядками, через 3—4 верш. рослинку од рослинки; через 3—4 тижні просапують. На зиму, щоб задержати сніг і тим оберегти рослини од мо-

розу, треба злегка чим прикрити. Квітки збирають в ясні дні, як тільки порозпукуються. При сушінні треба пильнувати, щоб не допустити цвілі. Квітки, не висушені добре, лехко псуються після пакування, а тоді порошок не має сили. З десятини можна зібрати 10 пудів сухих квіток, котрі дадуть стілько само порошка. Сухі квітки мелють або товчуть в ступах і висівають порошок; хоронять його в бляшанім чи склянім посуді, добре закоркованім. Перським порошком знищують блох, блощиць і тарганів, посипаючи оселю цієї нечисти. Для цього самого виробляють спирт і екстракт.

В Далмації культивують роман—*Chrysanthemum cinerariaefolium* T., з якого виробляють «далматський порошок», не уступаючий своїми вданнями кавказському і перському. На цю рослину значний смит. Петрогр. Фармацевт. Громада рекомендує її широко культивувати.

116) *Pyrethrum Tanacetum* D.—Канупір.

Канупір, відомий в аптеках під назвою *Herba Balsamitae*, рідко тепер вживають. Але зате його народ дуже любить; його часто можна зустріти по садках. Слідовало-б повернути увагу на цю рослину і користуватись нею при виробі пахучих річей. Любить соняшне місце і сухий ґрунт.

117) *Ranunculus flam. L., R. bulbosus L.*—Козелець, дрібноцвіт.

Ці рослини зустрічаються на вохких місцях—болотах і берегах річок. Народня зарада, допомагаюча

вистиганню наливів. *R. bulbosus* часами призначається лікарями. Розводити, запевне, не стоїть, бо деякі види рослини дуже ядовиті. При вживанні в середину роблять сильно побуджуюче враження, а при поверхнім—наживи і червоність. Користуються, як зарадою одволикаючою біль з иншого місця. Лічаться од ломця, невралгії і деяких хвороб на очі. Так як в сухім виді не мають сили, то готують настойку з 1 част. рослини на 4 част. звичайної горілки.

118) *Rheum palmatum* L.—Ревінь.

Ревіню є кілька видів. Татарський (*R. tataricum* L.) зустрічається на глиняниках в Персії, Прикаспійських степах і в Туркестані. Плоди і коренища тубольці вживають, як проносну зараду. Руска медицина признає для вживання тільки коренища ревіння лікарського (*R. off* B.), родом з Тибета, і тангутського (*R. palm* L.). Ревінь тангутський довго не був відомий ні Росії, ні Європі. Назбирав насіння ревіння в його ріднім краї, Північ. Китаї, мандрівник Пржевальський і передав його в 1871 р. Петрогр. Ботаничн. Садові Имп. Петра Вел.. Звідсіль ревінь розповсюдивсь по Європі. Поширення його культури у нас тепера дуже бажане через те, що російська фармакопея признала рівновартим з ревінном лікарським. Грунту він вимагає м'якого, торф'яного або чернозему. Землю тра перекопати в глиб на $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ арш., щоб коріння мало простір і могло рости більше і краще. Насіння сіють на грядках і легенько заграбують на $\frac{1}{2}$ д.. На другу

весну рослинки розсаджують через $1\frac{1}{2}$ ф., а на третій рік в осени, чи на четвертий равньою весною розсаджують знов рядками через $1\frac{1}{2}$ арш., а рядок од рядка через 1— $1\frac{1}{2}$ арш., так щоб між рядками можна було просанувати. В зах. Європі ревінь розводять на городах для їжи і в садках для декорації. Коріння ревіня для лікарських справ йде аж після 9—12 років життя. Викопують в осени і сушать $1\frac{1}{2}$ —2 місяці в теплій і сухій кімнаті, а тоді вже здають в лабораторію для виробу лікарства. Насіння ревіня в невеликім числі можна дістати од Петрогр. Ботан. Сада.

119) *Rubia tinctorum* L.—Марена.

Зустрічається на півдні, найбільш в Закавказзі. Рослина гиллякувата. Стебілля і листя по боках покриті колючою щетинкою, котрою рослина чіпляється за сторонні предмети. Листя блескуче. Зеленовато-жовті квітки. Цвіте літом. Плоди січні, спереду червоні, а далі чорні. Розводиться в Туркестані і в Закавказзі для добування з коріння і коренищ червоної фарби.

120) *Ruta graveolens* L.—Рута.

Дико росте в Криму, а в нас розводять на городах і в садках. Сіро-зелений кущик, з сильним, саморідним запахом. Цвіт віником. З трави вигонять сильно пахучу ефірну олію, котра находити собі споживок в медицині і косметиці. Свіжа трава, прикладана до тіла, викликає червоність і пухірі. Для

аптек збирають листя перед самим цвітінням і сушать в затінку; хоронять в добре заткнутім бляшанім чи скляним посуді. Траву для виробу ефірної олії збирають в пору цвітіння. У Франції рутою народ лічиться, при чім кількоразово спостерігались тяжкі випадки отруїння, навіть з смертельним скіном.

121) *Salvia* off. L.—Шавлія.

У нас зустрічається в садках і на городах. Розводять з насіння; сіють в росадник і пересаджують, або прямо в грядки, рядками; можна і діленням кущів в осени, чи з пасинків весною. Любить соняшне місце і сухуватий, м'який ґрунт; надмірно сильний запах має на вапняниках. Ефірну олію вигонять з листя, котре збирають перед цвітінням. Рослина медоносна. Є ще й другий вид шавлії (*S. pratensis* L.), що зустрічається в дикім виді на сухих перелогах і на проліссях.

122) *Saponaria* off. L.—Мильник, мильна трава.

Лікарське значіння цієї рослини невелике, її більш вживають при красінні шерстяних і шовкових тканин для віддалення тлустости. Вживають корінь (*Radix Saponariae rubrae*), а часом й зелень. Мильник росте в дикім виді на каменистих місцях і пісчаних берегах річок. На добрій, м'якій землі дає гарній врожай. При культивуванні сіють весною, не заскороджують, а тільки привальцьовують, або кладуть кусочки коріння в борозни. Коріння викопують в осени, миють,

вяжуть в пучки і сушать. Викопувати затайно: коріння сидить глибоко, а треба брати й мале, бо воно більш корисніше для діла. Дуже корисна річ при затяжних хворобах, для підчунюючих. На 1000 част. води беруть 30 част. ростертого сухого коріння чи листя.

123) *Sanbuisorba* off. L.—Родовик, сухозлотниця.

Зустрічається на вохких перелогах, косогорах і в чагарниках. Квітки кроваво-червоні в виді продовговатих головок, без пелюсточок. Коренище вживали в медицині, як кровоспинюючу зараду.

124) *Serratula tinctoria* L.—Серп.

Зустрічається на перелогах, в лісах і чагарниках. Колір цвіту пурпуровий. Цвіте в другу половину літа. Фарбою з листя красять шерстяні матерії на жовто.

125) *Symphytum* off. L.—Живокість.

Ця рослина зустрічається безмалъ по всій Європі, на Кавказі і в Сибірі на вохких місцях. Цвіте в травні—липні. Квітки в закрутках, хвіялкові чи біловаті. Розводиться в садках. Так як викопуванням коріння псуються перелоги, то цю рослину слідє культивувати. Розводиться так само, як проскурняк. В аптеки йде коріння (*Radix Symphyfi*), котре збирають в осени, розрізують вздовж і сушать. Вжива-

ють в середину в одварі чи в сиропі, як пом'якшуючу і злегка вяжучу зараду, при загноєнні легкого і при бігунці.

126) *Tanacetum vulgare* Г.—Пижмо, навротич,
мишка.

Пижмо в сучасні часи в деяких місцях зустрічається рідко. Ростає на всякому ґрунті; гарно вдається на смітниках. В аптеки йде зелень, цвіти і насіння (*Nerba, Flores, Semen Tanaceti*). Цвіти й насіння йдуть для внутрішнього й поверхнього вживання, а цвітучі стеблини для знищення моли та іншої нечисти. Розмножують діленням кущів, садять через 2 ф., і з насіння; сіють в розсадник, а потім пересаджують. Поранки ніякої не потребує. В народі вживають пижмовий порошок од глистів, а настоянку, як побуджуючу зараду і од трясці; пижмовою юшкою промивають гноєні рани.

127) *Taraxacum off. L.*—Кульбаба, летучка,
маївка.

Ця бур'янина зустрічається в середн. і півд. Європі і на Кавказі. Цвіте з весни до пізньої осені. Квіточки жовті. Корінь веретеном, з волосинками, в середині білий. В лікарування йде корінь з листям (*Rad. Taraxaci cum Nerba*) і корінь без листя (*Rad. Taraxaci*).

Корінь з листям збирають весною до цвітіння, а корінь без листя—в осені; і те й друге сушать. Культивування цієї рослини корисна

річ. Сіють рядками і порають, як буряки. Цвіт без перестанку зривають. Коріням користуються аж на другий рік.

128) *Tussilago forfara* L.—Цар-зілля, підбіль, ранник.

Ця бур'янина зустрічається на глиняниках, по проваллях, по боках доріг і на берегах річок. Цвісти почав зараз, як стає сніг. Цвіт її дуже походжпй на цвіт кульбаби, але вона одріжняється од кульбаби тим, що стеблинка її покрита маленькою, буроватою лускою і волосинками, а опріч того, листя на ній появляється після того, як вона перецвіте. В випаді культивування насіння змішують з піском і засівають рядками, через 4—6 верш. рядок од рядка. Цвіте аж на другу весну. Лікарське значіння має листя (*Folia Ferfara*), зібране весною з рослин, не менше двулітнього росту, як складна частина грудного чаю од кашлю.

129) *Urtica dioica* L.—Кропива.

Ця рослина має два роди—чоловічий і жіночий, як коноплі. Вся вона уतिकана пекучими волосинками і пушком. Цвіте літом. З прядива вироблюють тканини. В лікарування йде висушена трава і цвіт (*Nerba, Flores Urticae*). Науковою медициною лікарське значіння кропиви було занехано, але в недавні часи знов признано, що вона отримує в собі цілючі вдання. Французські лікарі свіжий сік з кропиви

призначають при кровохарканні, почечуйних кровоті-
чах і сильних місячках.

130) *Valeriana* off. L.—Овер'ян.

Зустрічається на вохких перелогах, в лісах і чагарниках. Цвіте в червні—липні. Культивують за-для коріння в Німеччині, Голандії, Англії и Америці. Розмножують з коріння, рядками, не густо. Любить високе каменисте місце. Коріння одбирають од 2—3 літніх рослин в вересні чи падолисті, сушать на дворі в затінку. При сушці треба берегти од котів, котрі дуже люблять запах овер'яна і при випаді можуть поїсти чи розтягнути. Найбільшу вагу має ефірна олія, котру вигоняють (0,4—1,2%) з коренища і коріння. Овер'яновий корінь і коренище (*Rhizoma seu Radix Valerianae*) вживають проти різних нервових хвороб, як вгамовуючу зараду і для побуждення діяльності серця, а найбільш при зомлілості. Природознавець Зарін свідчить, що наш овер'ян лучче загранишного. Петроградська Фармац. Громада рекомендує культивувати і радить випробувати вдачу овер'яну з сухого і вохкого місця.

131) *Veratrum album* L.—Чемериця біла.

Многोलітня рослина з облистяним стеблом. Околоцвітник білий чи зеленуватий. Зустрічається на перелогах і в чагарниках. Цвіте літом. Чемериця чорна (*V. nigrum*. L) одрижняється темно-червоним околоцвітником. Всі частини обох рослин ядовиті,

уже не раз вчиняли смерть. В медицині вживають коренище з корінням (*Rabix Veratri albi*) чи без посліднього. Збирають в осени, очищають од землі і сушать. Американські лікарі екстракт і спиртову настойку з коренища зеленої чемериці признають при плевриті, пнеймонії, острій манії, болях серця та инш.. В руску фармакопею чорна чемериця не включена.

132) *Viola odorata* L.—Хвіялка.

Ця рослина зустрічається в чагарниках і на пролісках. Коренища стелюче. Листя йде з прикорня. Квіточки самотні на довгих ніжках. Цвіте весною. Всі частини рослини ядовиті. У Франції з пахучих квіточок вигонять ефірну олію, котра йде в парфюмерне діло. В лікарування йдуть: коріння (*Radix Violae*), свіжі квіточки (*Flores Violae odoratae*) і сироп, зготований з свіжих квіточок. Хвіялковий сироп часами вживають од кашлю. Коріння у Франції дають на блювання. Любить полузатінок, суглинисту чи мерльну, вигнояну перегнойом землю. При розводінні заготовляють росаду з свіжого насіння і садять грядками по 4—5 рядків на 1½ арш. грядці. Можно розмножувати і діленням кущів, в осени чи весною. На зиму грядки прикривають листям. Поранка звичайна—сапують і підгортають. В засушливе літо поливають. Найлучче цвіте на другий і третій рік. Через 4—5 літ старі грядки скасовують і заводять нові. Квіточки збирають 2—3 рази на тиждень, без

допуцьків. Ефірну олію вигоняють того самого дня, коли збирають квітки. Десятина може видати близько 60 пуд.. Коріння викопують з старих, зкасованих грядок.

133) *Viola tricolor* L.—Братки, полуцвіт.

В аптеки йдуть тільки польові братки (*Herba Violae tricoloris*) з маленькими квіточками, пелюсточки котрих мають світло-жовтоватий і біловатий колір. Грунт потребують посередній. Засівають в марці чи цвітні рядками, добре поливають, поки не посходять; кілька раз зворушують землю. Іноді сіють літом, в вересні пересаджують і збирають в травні аж наступного року. Однолітні рослини цвітуть тільки в липні і серпні і не дають такого врожаю. Можна засіяти з клевером чи чим иншим і дати здичавіти. Траву збирають, як тільки почне добре розцвітатись, кілька раз на літо і скоро сушать. Настойкою (30—60 част. на 1000 част. води) лічаться од золотухи. Петроградська Фармацевтична Громада радить звернути повагу на побільшення збирання трави цієї рослини.

Кущі і дерева.

134) *Amygdalus communis* L.—Мигдаль.

Це дерево, родом з серед. Азії, в дикім виді росте в Туркестані і Закавказзі. Культивується в півд. Франції, Італії, Іспанії та инш.. У нас солодкий і гіркий мигдаль розводиться в Бесарабії, Криму, на схід. березі Чорного моря і в Закавказзі. Розводяться з насіння дички, через 3—4 роки їх пересаджують і тоді прищеплюють з иншого сорту, гіркого чи солодкого. Родити почав аж після 15 років життя; найлучче родить з 30 по 40 рік життя. З солодкого мигдаля готують молоко, котре служить заспокоюючою зарадою. Мигдальну олію (з солод. мигд.) дають в середину дітям, як проносне.

135) *Cydonia vulgaris* Pers.—Квитове дерево, куделя,

Цей кущик чи деревце зустрічається в дикім виді в Закавказзі. Розводять за-для плодів в Бесарабії, Криму і на Кавказі. В лікарування йдуть свіжі плоди й насіння. Розводять з пасинків, прищеплюють на диких грушах. Любить тепле місце и добру, вохковату землю.

136) *Daphne Mezereum* L.—Вовче лико.

Прямостійний кущик, розповсюджений безмалъ по всій Європі і північ. Азії. Вся рослина ядовита. В

лікарування йдуть кора з гилляк і спілі, сушені ягоди. Кору збирають в січні—лютні і сушать. В науковій медицині кору вживають тільки поверхньо для роз'ятріння шкіри і наливів, а в народній медицині—це любима зарада знахорів, котрі своїм нетямом псувають людське здоров'я, і навіть труять. Часом труяться діти свіжими ягодами вовчого лика, находячи їх в лісі і ласуючись їх гарним видом.

137) *Fagus silvatica* L.—Бук.

Ця деревина зустрічається в лісах по всій Європі, в захід. Азії, Японії і на Кавказі. В лікарування йдуть продукти з цього дерева: дьоготь, креозот і гваякол. Плоди бука отримують в собі: 43—45% тлустої олії, крохмаль, цукор та инш.

138) *Fraxinus Ornus* L.—Ясен.

Цей кущик чи деревина розповсюджений в дикім виді в півд. Європі, Малій Азії і в Туркестані. Розводиться за-для цукрового соку, з насіння, в грядках, весною чи в осени; через рік пересаджують. Через 8—10 літ деревина досягає $1\frac{1}{2}$ —4 саж. вишини. В лікарування йде сухий сік (манна), що вибігає з надрізів. Добувають манну в сухе надвір'я в липні і серпні. Манну вживають, як м'ягку проносну зараду, а також для поліпшення смаку инших проносних лікарств.

139) *Genista tinctoria* L.—Дрік.

Цей кущ з прямостійними гілляками зустрічається на пісчаних і вапняних ґрунтах в лісах, чагарниках і перелогах на Україні, Кавказі і захід Сибірі. Листя по боках покрите пушком. Жовтий цвіт зібраний на кінці гіллячок щіточкою. Розводиться в садках. З стеблин, листя і цвіту вироблюють жовту фарбу для красіння тканин.

140) *Juglans regia* L.—Оріх' волоський.

Дико зустрічається в Закавказзі. Розводиться безмалю по всій зах. Європі і в інших краях, а в нас на півдні. Тверда, щупка деревина дуже славиться в столярній ділі. Плоди йдуть в їжу і на здобичу олії. В лікарування йдуть: листя, шкурлупа з орехів, олія і кора білої орешини. Листя збирають в червні, як ще добре не розвіється, розстелюють тонкими шарами і скоро сушать на сонці; м'ясисту шкурлупу збирають з неспілих плодів, приблизно в серпні, і скоро сушать в теплій мешканні; олію вичавлюють з спілого насіння. Кору з білої орешини збирають в осени, очищають верхню шуршину (в діло йде тільки внутрішня частина кори), і висушують. Листя вживають в середину в одварах од золотухи, а поверхню-для примочок. Шкурлупа йде на фарбування волосся і на готування дорогих вин, а найбільш на фарбу для красіння шерсті й дерева. Кора служить лехкою проносною зарадою.

141) *Juniperus communis* L.—Яловець.

Завжди-зелений, дуже гиллякуватий кущик. Зустрічається в лісах. Цвіте весною. Тверда деревина йде на столярні вироби. В лікарування йдуть сушані спілі ягоди, деревина стовбура і коріння, а також ефірна олія з плодів і деревини. Ягоди збирають в осени і сушать на вільнім дусі в мешканні. Деревина стовбура й коріння йде в продаж в виді дрібненьких трісочок. Ефірну олію добувають парою з пом'яшкораних—стовбура, гиллячок і листя. Ялівцеві ягоди головним робом-народня зарада, а часами ними користується і наукова медицина, як сечегонною заradoю; їх вживають в середину в одварах і настоях при кепським їжовариві. З ягід, так як в них є багацько цукру, гонять горілку, котру французи називають «Genievre», а шотландці—«Gin» (джін). Другий вид (*juniperis sabina* L.)—яловець казацький-зустрічається на сухих, соняшних місцях. Вся рослина ядовита. В лікарування йдуть сушані верхки з молодих гиллячок з листям і ефірна олія з них. Збирають в квітні і травні, сушать в затінку, після чого хоронять в добре закоркованім посуді, в теплім місці; запаси щорічно поновляють. Медичне значіння ялівця козацького в сучасні часи невелике.

142) *Laurus nobilis* L.—Лавір.

Завжди-зелене дерево. Зустрічається в дикім виді в Криму і захід. Закавказзі. Цвіт дрібненький, двух-родовий, жовтовато-білий. Розводиться в півд. Швей-

царії, Англії, Ірландії і Шотландії за-для листя (бобкове) і плодів. В лікарування в сучасні часи йдуть тільки плоди і олія з них. Сушане листя і ефірна олія з нього тепер майже зовсім не мають медичного значіння. Плоди вживають поверхньо--йдуть на мазь од користи. Листя (бобкове) йде на праву їжи. Петрогр. Фармацевт. Громада радить поширити збирання листя для парфюмерного діла.

143) *Ledum palustre* L.—Багно, болотник.

Прямостійний, завжди-зелений кущик розповсюджений в середн. Європі, в північ. і серед. Росії, на Україні і в Сибірі. Зустрічається на торф'яних болотах. В лікарування йде листя (*Folia Ledi palustris*), котре збирають в пору цвітіння і сушать. Наукова медицина тепера ним не користується. Має споживок в гомеопатії (од ломця) і в народній медицині. В перші часи деякі несумлінні пивовари замісто хмелю клали листя цієї рослини в пиво, що викликало сильні головні болі. Йде на вичинку шкур. В домашності багном виводять міль і блощиць, а одваром з листя знищують иншу нечисть.

144) *Ononis spinosa* L.—Вовча трава, вовчук.

Цей колючий кущик зустрічається на переліссях і перелогох. Самотні рожеві квіточки сидять в кутках між листям. Цвіте літом. Коріння (*R. Ononidis*, инше *R. Restis bovis*) вживають в медицині, як потогонну і сечегонну зараду. Збирають в осени і сушать.

145) *Pinus silvestris* L.—**Сосна.**

Це дерево зустрічається по всій Європі, в Сибірі, Криму і на Кавказі. В лікарування йдуть: сушені бруньки, вигікаючий з надрізів стовбура і гилляк бальзам—звичайний терпентін, смола, живиця, оцет, шпигинар, дьоготь, ефірна олія і екстракт з листя та инш.. Бруньки збирають весною в ясне надвір'я і сушать в теплім мешканні, хоронять в добре закоркованім бляшаннім посуді, не довше одного року. Ефірну олію добувають з свіжого листя парюю.

146) *Pòpulus*.—**Тополя.**

Цей рослини є кілька видів: осика (*P. tremula* L.), сокір (*P. nigra* L.), золота верба (*P. balsamifera* L.) та инші. В лікарування йдуть бруньки золотої верби, котрі збирають в березні і квітні, і в свіжім виді вони йдуть на готування екстракту. Топольові бруньки отримують в собі: ефірну олію, жовтозелену, гірку смолу, віск, чиньбарні речі та инш. Мазь з топольових бруньок вживають при перев'язках ран, як прохолоджуючу і вгамовуючу зараду, а топольове вугілля—проти нервових мук в животі. В народній медицині вживають настойку на спирті з бруньок золотої верби (*P. bals. L.*) при лікаруванні всяких ран і прикладають до прищипленого місця. Ці деревини ще мало розвідані науковою медициною. Тополі легко розмножуються з живчиків в вохкім ґрунті.

147) *Punica Granatum* L.—Гранатове дерево.

Ця деревина чи кущ в дикім виді зустрічається на Кавказі, в Хиві і півд. Сибірі. Розводиться за-для плодів і як декоративна рослина на півдні. Європи і в інших краях з теплим кліматом. В лікарування йде кора стовбура, гиллячок і коріння дикоростучої деревини. Цвіт збирають тільки з махрових різностайностей. Кору вживають (настойку на холодній воді) од глистів. Плодова шкурлупа йде на вичинку і фарбування шкур, а надто на Сході при виробі сап'яну.

148) *Prunus Cerasus* L.—Вишня.

Вишень є сила всяких різностайностей. В лікарування йдуть свіжі, темночервоні, спілі ягоди звичайної кислої вишні. Свіжі ягоди вкупі з камінцями товчуть в камінні ступі на кашу, дають ці капі злегка переграти при 20—25°, при частім мішанні, в продовженні кількох днів; після цього сік вичавлюють, 2—3 дні вистоюється при 15—20°, переціджується через вату і йде в такім виді на готування сиропу. Вишневий сироп служить для поліпшення смаку інших лікарств.

149) *Quercus pedunc* E.—Дуб.

Це дерево розповсюджене по всій Європі, західн. і серед. Росії, в Криму і на Кавказі. В лікарування йде сушана кора молодих стовбурів і гилляк і пе-

чені, спілі жолудики. Кору збирають весною, зараз як розпустяться бруньки, сушать в мешканні, але так щоб вітер проймав. Жолудики збирають спілі, знімають шапочки і сушать попереду на дворі, а потім в печі; з сухих знімають шкурлупу і печуть, як звичайний кофій, в жаровні, поки не стануть бурими. Дубова кора йде на вичинку шкур. Є ще друга порода дуба—зимній (*Q. sessilijloza* Sm.), що зустрічається в Польщі, на Україні, в Криму і на Кавказі.

150) *Rhamnus Frangula* L.—Крушина.

Цей кущик чи деревце зустрічається по вохких чагарниках і лісах. Цвіт зеленуватий пучечками в кутках між листям з 5 пелюсточками. Цвіте в травні—червні, а під осінь дає круглі, м'ясисті, з початку червоні, а потім чорні, з 2—3 камінчиками, ягоди. Рослина медоносна. Розмножується з насіння. Пересаджують річні рослини. В лікарування йде сушена кара стовбура і гілячок молодих кущів, зібрана весною. Користуються корою після річного лежання в сухім місці. Крушинна кора (*Cort. Rhamni Frangulae*) і екстракт з неї служать проносною зарадою. Вугілля з цієї деревини йде на вироблення пороку (стрільного), а з камінчиків вироблюють фарби: з неспілих—жовту, а з спілих—зелену.

Другий вид крушини—жостір (*Rh. cathartica* L.) зустрічається там само. Цвіт з 4 пелюсточками. Ягода безмалю всі чорна, завбільшки з горошину, з

січною, зеленоватобурою мяккістю і 4 камінчиками; кожен камінчик з одною насінниною в середині. В лікарування йдуть свіжі, спілі ягоди, котрі збирають в вересні—жовтні. З свіжих ягід вичавлюють сік, котрий після легкого грання йде на готування сиропу. З соку теж вироблюють темнозелену акварельову фарбу (назив. по німецькі—«Satigün», по франц.—«vert de vessie», а камінчики дають такі самі фарби, як і попередня рослина.

151) *Rhamnus Purshiana*.—Крушина американська.

Ця деревина росте на горах в Каліфорнії і в других місцях північ. Америки; вона дає кору (*Cortex cascarie, Sagardae*), котру збирають в цвітні—травні і вживають, як проносну зараду. Ця кора випихає кору нашої крушини. На цю рослину треба звернути повагу. Звісно, що молоді рослинки витримують зиму в Ботаничн. Саду Юрієвського Університета. Зібрана кора повинна пролежати в сухім мешканні два—три роки так, а потім йти в діло.

152) *Rhus taxicod. L.*—Сумак, скомпія.

Сумак—страшенно ядовита рослина. В аптеки йде спіле листя (*Folia Rhois Toxicodendri*), хотре збирають літом; збирати тра в пальчатках, закривши обличчя; лучче всього зрізати ножицями і зараз складати в посуд, бо одно доторкнення може викликати на шкірі пухірі, а молочний сік—нариви, кот-

рі не сходять кілька літ. Певна річ, що цю рослину можуть розводити одні тільки аптекарі. Любить соняшне місце.

153) *Rosa gallica* L.—Повна рожа, троянда.

Цей колючий кущик зустрічається в дикім виді по всій середн. Європі, на Україні, в Криму і на Кавказі. Квітки великі, пахучі, по 1—2 на кінцях гіллячок, з 5 пелюсточками, звичайно пурпурово-червоні, а часом і світліші—рожеві чи біловаті. Цвіте в травні—червні. Рожу культивують масами у Франції, Голандії і Німеччині головним робом за-для цвітових пелюсточок, з котрих вигонять рожеву олію, а почасти вони йдуть в медицину, на консерви і варення. В Румелії культивують так називну казанликську рожу (мішанина французької—*R. gall.* L. з шипшиною—*R. canina* L.) 150 сіл. В Німеччині казанликську рожу культивує фабрика ефірних олій *Шіммель і К^о*, котра має в Мілтиці коло Лейпціга плантацію в 32 дес., даючу щорічно 16¹/₄ тис. пудів квіток; з них фабрика вигонить близько 6¹/₄ пуд. рожевої олії, на гроші—65 тис. руб.. На півдні в нас вже робили спитки культивування цієї рожи, при чім є рація гадати, що її можна культивувати й даліше на північ; ця рожа витримувала зими при 22° морозу. А як взяти на увагу те, що цю рожу можна прищеплювати до шипшини, то культивування її забезпечене. Пелюсточки для сушіння збирають перед роспусканням квіточки, як вона ще даbre не

розвинеться. Рожеву олію добувають з тільки що розвинутих квіточок*). Лікарське значиння рожи тепер невелике.

154) *Rosmarinus off. L.*—Розмайраб.

Цей завжди-зелений кущик розповсюджений по сухих, скелистих місцях Середземного моря. Культивується за-для листя і ефірної олії в півден. краях Європи і місцями в нас. В Криму і Закавказзі він витримує зиму, а в холодніших місцях кущі його викопують і ховають в льох, прикриваючи коріння землею. Любить одкрите високе місце, з легким, сухим ґрунтом, а найбільш—вапняне. Розмножують з пасинків, діленням кущів і рідко з насіння; в останнім разі сіють в теплиці і пересаджують. В лікарування йде листя і ефірна олія. Листя звичайно збирають в пору пвітіння; зрізають цілі гіллячки, розкладають і сушать на сонці, після чого листя одділяють од стеблля. Ефірну олію вигоняють паром з свіжого і часами сухого листя. Вживають листя найбільш поверхню. В народній медицині листя—дуже розповсюджена зарада, а часами вживають і злочинно, як abortivum. Олія служить роз'ятруючою шкіру зарадою, а найбільш вона йде в парфюмерію на одеколонн.

*) Більш ретельно відносно культури рожи і виробів з неї можна ознайомитись з кнпг: „Кичуновъ.—Культура розы. 1893. Базаровъ и Монтеверде.—Душистыя растенія и эфирныя масла“.

155) *Rubus idaeus* L.—Малина.

Культивується много різностайностей по садках і городах. Грунтом не перебирає. В лікаруванні вживають тільки свіжі, червоні ягоди, котрі йдуть на готування малинового сиропу (готується таким робом, як з вишень). Малинковой сироп вживають тільки для поліпшення смаку інших лікарств. В народній медицині сушені ягоди—гарна потогонна зарада при простуді; заварують, як чай. Ягоди лісної малини запахніші і смашніші.

156) *Sambucus nigra* L.—Бузина чорна.

Розводять бузину головним робом як декоративну рослину і в виді живої обгороджі по садах і парках і часами для виробів деяких річей. Грунтом не перебирає. Розмножується з пасинків і кориневих паростків. З пахучого цвіту перегананням готують бузинову воду, котра йде в парфюмерне діло. Ягоди йдуть на готування оцету і на фарбування на червоно вин. В лікарування йдуть: сушений цвіт, свіжі ягоди і сушена кора з гиллячок. Цвіт збирають, як тільки-но роспуститься. Ягоди збирають стиглі і раз з них вичавлюють сік, котрий йде на готування екстракту. Кору збирають весною з молодих, але грубих гиллячок, очищають верхнє шурушіння і сушать. Кора отримує сильні сечегонні вдання. Цвіт вживають, як потогонну зараду, а также на положання і оклади. Екстракт подміщують до потогонних і проносних лікарств.

157) *Solanum Dulcamara* L. — Паслін, глистяк, надтинник.

Цей півкущик розповсюджений безмалъ по всій Європі, захід. Азії, північ. Америці, в Криму і на Кавказі. Має стелюче, дуже гиллякувате, грубе, дерев'янисте коренище. Квіточка зірочкою, хвіялкова, рідко біла. Цвіте з травня до липня. Всі зелені частини рослини отримують отруйні вдання, а спілі ягоди безвадні. В лікарування йде молоде (1—3 річ.) стебілля, котре збирають в осени після опадення—чи весною до розвитку листя і сушать. З стебілля готують екстракти, котрі вживають при затяжних хворобах шкіри, а також при пухлятині (водянці) і жовтяниці. В визначеннях випадках, іднаково, це лікарство не находить собі усиправедливлення—його лучче призначати при загноїнні дихальних органів, астмі і кашлюкові

158) *Thymus Serpyllum* L. — Чебрець, чебрик.

Маленькій, стелючий кущик. Зустрічається по всій Європі на одкритих пісчаннх місцях, полях, косогорах і в чагарниках. Стебілля тонке, буре, стелюче; гиллячки гранчасті. Квіточки дрибненькі, звичайно чеввоноваті. Культивується місцями за-для виробу ефірної олії, котра головним робом йде в парфюмерію; для цієї цілі рекомендується розводити чебрець з цитриновим запахом (*T. citriodoris* Schreb.). Розмножують з насіння і діленням кущів. В лікарування йде сушена, цвітуча рослина з листям і

тоненьким стебллям (Herba Serpylli), грубі стеблинки і корінці одкидаються. Збирають звичайно в червні—липні, сушать і хоронять в бляшаннім посуді. Ефірну олію добувають парою з свіжої чи сухої трави.

159) *Thymus vulgaris* L.—Чебрець пахучій.

Низенький кущик. Зустрічається дико на сухих місцях в півд. Європі, а в культурі розповсюджений майже до 70° північ. шир.. Стеблина прямостійна, дуже гиллякувата; гиллячки сіроваті, пушисті, гранчасті. Квіточки дрібненькі, рожеві чи світлохвілкові або білі. Культивують цю пахучу рослину для лікарського споживку і для виробу ефірної олії. Розводять в садках чи городах, місце вибирають соняшне, зь легкою, м'якою, суховатою землею. На півдні ця рослина більш пахне. Розмножують весною діленням кущів чи з насіння, котре засівають в березні в теплицю або в квітні прямо в ґрунт; на зиму кущі підгортають землею. В лікарування йде сушена трава (Herba Thymi) і ефірна олія. Траву зрізають в пору цвітіння, вяжуть в пучки і сушать в затінку. Ефірну олію вигонять парою з цвітучої трави. Чебрецева олія найбільш йде в косметику.

160) *Tilia parvifolia* E.—Липа.

Це дерево розповсюджене по всій Європі до 63° північ. шир.. В лікарування йде цвіт (Flores Tilia), зібраний в сухе надвір'я, як ще добре не роспустивсь.

Сушать на сонці і хоронять в добре закоркованім посуді. Липовий цвіт вживають в виді чаю, як потогонну зараду. Липове вугілля йде на готування зубних порошоків.

161) *Vaccinium Myrtill* L.—Чорниця, боровиця,

Цей низенький кущик звичайно зустрічається в лісах і часами в чагарниках. Стеблина бура, гиллякувата. Квітки зеленуваті з рожевим одтінком. Ягода кругла, завбільшки з горошину, 4—5 гніздна, січна, синьовато-чорна. В лікарування йдуть спілі ягоди, як свіжі, так і сушені (*Fructus Myrtilli*). Ягоди опріч лікарсько мають і промислове значення—вони йдуть на фарбування вин і інших напитеків.

162) *Vaccinium Oxycoccus* L.—Журавина.

Маленький, завжди зелений кущик, розповсюджений в північ. і середн. Європі, на Україні і в Сибірі. Стеблина гиллякувата, тонка, ниткою, стелюча. Квіточки пурпурові, часами білі. Ягода кругла, а часом на вид яйця, 4 гніздна, січна, спереду біла, а потім яскравочервона, блискуча; досягає в вересні—жовтні. В лікарування йдуть спілі ягоди, з котрих в свіжім виді готують морс і сироп (*Potus і Sirupus Oxycocci*). Звичайно ягоди збирають пізно в осени, як їх трохи прихватить морозом, тоді вони січніші і кисліші.



Абетлова вназивна рослин.

	стор.		
Аір.	24	Вишня.	76
Арипка.	31	Гадин язик.	15
Багно.	74	Гадючий корінь.	31
Бараняча трава.	31	Ганус.	18
Білий сон.	30	Ганус кульшастий.	—
Блекіт.	8	Гірчак.	58
Бобовник.	54	Гірчиця біла.	20
Божі ручки.	58	„ сарептська.	—
Болотник.	74	„ чорна.	—
Болиголов.	8	Глекопар.	39
Борець.	24	Глистяк.	82
Боровиця.	84	Горлянка.	26
Бородач.	43	Горицвіт жовтий.	25
Братки.	69	Горицвіт червоний.	—
Будяк.	7	Гостровершки.	26
Бузина чорна.	81	Гранатове дерево.	76
Буковиця.	37	Гребінник.	45
Буркун жовтий.	14	Далматський роман.	60
Буркун зілля.	—	Деревій.	28
Бук.	71	Дзвіночки.	52
Васильки.	16	Дрібноцвіт.	60
Вечерниці душисті.	47	Дрік.	72
Відкасинок.	38	Дрисливець.	46
Відьмине зілля.	40	Дуб.	76
Вовча трава.	74	Дудник.	1
Вовче лико.	70	Дивина.	21
Вовчі ягоди.	37	Диндир.	9
Вовчук.	74	Дягиль.	1
Вороне око.	57	Дягиль городній.	2
Вивішний.	45	Жостір.	77
		Журавина.	84

Живокість.	64
Зайців льон.	52
Зозуліни черевички.	24
Золота верба.	75
Золототисячник.	46
Зимовик.	41
Ісоп.	48
Калачики.	12
Канупір.	60
Квитове дерево.	70
Козелець.	60
Козяча борода.	34
Коляндра.	8
Конвалія.	41
Коноплі.	5
Копитець.	35
Косарики.	9
Корінь жовтий.	49
Кривавник.	23
Крокіс.	5
Кропива.	66
Крушина.	77
Крушина американська.	78
Крин.	51
Куделя.	70
Кульбаба.	65
Куросліп.	29
Лаванда.	51
Лавір.	73
Левурда.	57
Лелія біла.	51
Летучка.	65
Ломиніс.	43
Попух.	3
Липа.	83
Лиходійна трава.	50

Любжа.	55
Любка.	57
Любисток.	52
Маівка.	65
Мак.	17
Мак дикий.	—
Малина.	81
Марена.	62
Материнка.	56
Майоран.	—
Медвежаче вушко.	21
Медунка.	59
Молочай.	12-39
Морозник зелений.	47
Морозник чорний.	—
Мучниця.	30
Микгдаль.	70
Мильник.	63
Мильна трава.	—
Мишка.	65
Мята садова.	53
" холодна.	—
" цитринова.	52
" японська.	53
Навротич.	65
Нагідки.	4
Надтинник.	82
Нарцис.	55
Наперстянка.	9
Німція.	12
Нічна фіалка.	57
Нехворощ.	34
Овер'ян.	67
Огірочник.	4
Оман.	49
Оріх волоський.	72

Острогон.	34
Осика.	75
Папороть.	36
Парник, парило.	26
Паслін.	82
Пахуча смілка.	36
Пахуче кадило.	15
Первоцвіт.	29
Переступень	38
Перець струковий.	5
Петрові батоги	40
Петрушка.	17
Підбіль.	50
Півники.	66
Подорожник.	19
Полинь.	32
Полинь цитварний	33
Проліска.	29
Проскурняк.	29
Проскурки.	12
Пижмо.	65
Ракові шийки.	57
Ранник.	66
Рай-дерево	19
Ревінь.	61
Репях.	3
Ріжки.	6
Родовик.	64
Рожа.	27
Рожа повна.	79
Розмайран.	80
Роман.	13
„ далматський	60
„ кавказський	59
„ перський	—
„ римський	14

Ружа.	27
Рута.	62
Рута польова	11
Рицина.	19
Святоянське зілля	48
Сердушник.	10
Серп.	64
Серпоріз	23
Скомпія.	78
Смілка.	52
Собачі репашки	3
Сокір.	75
Сокірки.	9
Солодковий корінь.	45
Сон, сон трава.	29
Сорочі лапки.	58
Стародуб	50
Сосна.	75
Стрілки.	3
Сумак.	78
Суховершки.	26
Сухозлотниця.	64
Татарське зілля.	24
Тмін.	38
Товстуха.	44
Тополя.	75
Троянда.	79
Трифолія.	54
Турган.	34
Тирлич.	44
Тютін.	15
Укріп.	1
„ волоський	11
„ кінський	16
Филійник.	30
Филійник америк.	31

Хвіялка.	68	Чорно-зілля.	23
Хміль.	47	Чорно-корінь.	43
Хмій.	38	Чорнушка.	15
Царь-зілля.	23-66	Чорниця.	84
Часник.	1	Чихавка.	23
Чебрець.	20	Шавлія	63
Чебрець пахучій	83	Шафран дійсний.	42
Чебрик.	82	Шафран дикий.	41
Чемериця біла.	67	Яловець	73
Чемериця чорна.	—	Яловець козацький.	—
Череда	3	Ясен.	71
Чорнобіль.	34	Ясенець.	10

Значніші друкарські помилки.

Сторін.	Рядок.	Видруковано.	Треба читати.
3	23	рбніній	дрібний
4	14	спристуються	користуються
—	19	включенний	включений
—	27	лікаруванні	лікаруванні
8	12	хворобак	хворобах
10	7	подагрі	подагрі
11	20	буряннина	бур'янина
—	27	хорувані	хоруванні
12	19	буряннина	бур'янина
—	—	Бживають	Вживають
13	24	надвіря	надвір'я
—	26	„	„
14	17	надвірю	надвір'ю
16	15	горний	гарний
—	17	побільшуючу	побільшуючи
17	10	південій	південній
17	16	буряннина	бур'янина
18	2	зароду	зараду
23	4	буряннина	бур'янина
25	5	йде	їдуть
—	6	„	„
27	23	Звычайно	Звичайно
28	15	надвіря	надвір'я
29	13	„	„
31	20	Arnica amontana	Arnica montana
32	24	буряннина	бур'янина
34	4	буряннини	бур'янини
36	1	розівється	розів'ється

36	18	надвіря	надвір'я
37	16	котре	котрі
38	21	родиться	радиться
39	21	бурянина	бур'янина
42	9	надвіря	надвір'я
—	22	буряну	бур'яну
—	25	бурян	бур'ян
44	5	надвіря	надвір'я
46	14	котрою	котрого
53	10	(M. sativa L.).	(M. sativa L.),
54	25	(Folia Menyant.).	(Folia Menyant.),
60	1	Крітки	Квітки
61	18	європі	європі
—	19	ревіння	ревіня
67	9	ед	од
—	26	одрижнюється	одріжнюється
68	2	беі	без
—	3	земль	землі
—	5	припають	призначають
69	3	зкасовують	скасовують
72	12	щупка	цупка
73	6	збірають	збирають
74	5	в живають	виживають
76	4	півдні.	півдні
—	16	камінні	камінній
78	3	збирають	збирають
—	8	vessie“;	vessie“),
82	19	Маленькій	Маленький
—	23	червоноваті	червоноваті